

Pre-Linnæan
Q12349.7
R4
1692-1703
c. 1
v. 11-12
Cal. 18
1-8

HORTI MALABARICI PARS UNDECIMA, DE HERBIS ET DIVERSIS ILLARUM SPECIEBUS

Latinis, Malabaricis, Arabicis, Brachmannum characteribus nominibusque expressis.

Adjecta Florum, Fructuum, Seminumque nativæ magnitudinis vera delineatione,
colorum viriumque accurata descriptione,

ADORNATA

Per Nobilissimum ac Generosissimum D. D.

HENRICUM VAN RHEDE TOT DRAKESTEIN,

Toparcham in Mydrecht, quondam Malabarici Regni Gubernatorem supremi Confessus apud
Indos Belgas Senatorem Extraordinarium, nunc vero Equestris Ordinis nomine Illustribus
ac Præpotentibus Provinciæ Ultrajectinæ Proceribus adscriptum,

In ordinem redegit & latinitate donavit

ABRAHAMUS A POOT M. D.

Notis adauxit, & Commentariis illustravit

JOANNES COMMELINUS,

Republicæ Amstelodamensis Senator, ac Horti Medici præfector.

Mo. Bot. Garden,



AMSTELÆDAMI.

Sumptibus Viduæ IOANNIS van SOMEREN, Hæredum JOANNIS van
DYCK, HENRICI & Viduæ THEODORI BOOM,

Anno c1o 1o c xci11.

M D C X C I I

Kapá-tsjakka.



HORTI MALABARICI PARS UNDECIMA.

DE

HERBIS ET DIVERSIS ILLARUM SPECIEBUS.

K A P A - T S J A K K A.

TABULA I. II.



Ramannes & Lusitani *Ananās* dicunt, dum triumve pedum planta, arenosa & aquosa amans loca. *Radix* crassiuscula, undiquaque longas, capillatas, nonnihil nodulatas, albicantes spargit fibras; media pars obtortæ radicis formam obtinet. Primæ radici-formes scaturigines exteriori trunci lamellæ inseruntur, foliaque inferiora perforant, & quidem illic loci, ubi folia decidua aliquantulum putrefacta, maxime conspicuæ; foliis vero vegeto virore expansis, evanescent. Laterales radiculæ trifariam nobis ostendunt phasin, prima subfusca est & filamentosa, altera lignea, albicans, muscosa, tertia sive medullaris nervea, prædura, admodum firma. *Caulis* è radice exsurgit unicus, rotundus, rectus, sine stolonibus; ex hoc *caudex* tripedalis, fructum

nempe si annumeres, crassiolus, pollicis ferme latitudinis, viridi, nitente, glabro cortice obductus, qui semiannulatis geniculis interstinguitur; interiori parte spongiosus, fistulosus, medulla albicante, succulenta, fibrosa instructus; humor illius aqueus est & subdulcescit. *Folia* ex semiannulatis erumpunt geniculis, alternato ordine, illorum bina totam trunci peripheriam arctissimis complectuntur vinculis, inferiori parte confertim, superiori laxius trunco adnectuntur; oblonga sunt, supra fructus in fastigium excrefcentia, sinuosa, sensim in cuspidem aculeatum stricta, interiori parte concava, fibris in utraque superficie laxioribus & fungosis pertexta, quæ regulari nexu procedunt, quarum interiores cæteris majores, crassiores ac valde duræ; ubi radículas ejaculantur obliquo, secus recto ductu procedentes, candicantes: Interior sinus subviridescit, illius latera, ad unius circiter digiti crassitiem, fusco virore nitent; in laciniis, jam describendi aculei, congruo & quasi artefacto ordine, infiguntur; unumquodque *folium* in duas dispecitur laminas, cujus convexa, pars rarioris, concava autem densioris structuræ est; folium ordine sextum, per universum hunc truncum, aliud, rectà è diametro oppositum, habet, adeo ut totus truncus hexagonus, ob circularem & cochleatam foliorum compaginem, dici queat; semilunares foliorum ungues concinna infertione trunco firmiter adhærescunt, superiori vero membranula, reliquæ foliorum substantiæ, viridescentibus fibrillis agglutinantur. In oris folia hæc muniuntur spiculis, ceu aculeis densis, rigidis, acutis ac incidentibus, versus cuspidem parum incurvis, non tamen aduncis; inferior pars circa caulem ad duos tresve pollices sine aculeis est; contextura illorum rigida, crassa, densa, spissa, venulis paralellis, ex unguiculis ad cuspidem, qui magis durus & rigidus, striata; quæ ad inferiorem caulis partem prodeunt, oblongiora sunt, in vetustiore planta ex viridi subflavescent, ad oras ex flavo rufescunt, ut & in spiculis aculeatis, in parte superiore extra oras rubescunt, colore saturo rosaceo, in parte nempe ima ac interiori, in

ex-

exteriori incarnatè rubescunt, in superiori flavescent, circa latera farinaceo ac albicante rore laneisve floccis conspersa: superiora unà cum inferioribus ejusdem sunt figuræ, circa caulis cacumen interius in una parte sanguineo-faturo ac vivido nitente rubore suffusa, albicantibus punctis interspersa, rosam, tulipamve marmoream dices, versus cuspidem fusco & nitente virore, vel etiam sanguineo, si teneriora sunt, in exteriori latere colore vivido incarnato, superne viridescencia vel ejusdem incarnati coloris, farinacea quoque nive, qua color incarnatus ceu viror in foliis obfuscat, conspersa, illa remota ipse foliorum color plenius sese conspectui offert; singulorum foliorum apices præduris aculeis mucronantur: unumquodque folium gemmam continet, quæ licet per exigua, integram tamen plantam perfectissime in se comprehendit, pedunculo trunci circuitui, exteriori nempe ejus lamellæ, insertam.

Fructus, in quo flores proveniunt, in caule excrescit unicus, cacumini ejus insidens, veluti nodus, superioribus foliis inferne succinctus, strobiliformis *Pini Italici* fructum referens, in totum *Cinaræ* instar, foliis futurorum florum operculis, eleganti specie constructis, atque in modum cochleæ (si nempe à læva versus dextram foliorum ordines insequaris, alias rectius exsurgunt) ipsum fructum obsepientibus, ita ut sextum in ordine, semper è diametro aliud oppositum habeat, ubi bina ad latera paria circumstant. Foliis hisce rhomboïdæis, cuspidatis, surrectis, rigidis, ad verticem sensim minoribus, etiam in oris, cuspidibus ceu aculeis parvis ac rigidis munitis, venis in longum, versus cuspidem striatis, antè sanguinei ac nitentis coloris, ut & exterius, ubi albicante farina obfuscat, in unguiculis viridescentibus. E vertice strobiliforme, oblongum capitulum, pulchramve potius rosam foliaceam emittit; in germinationis exordio, perinde ut cætera fructus folia, rubram, atque in sui accretione viridescentem, sed ubi lanuginosa tunica obvelatur, purpuream; in sui principio arcte, congruo tamen ordine com-

compactam, sensimque magis expansam, in apice splendide virentem. Integer fructus pyramidalibus conflatur capsulis, ab interiore caule ad extimum corticem decurrentibus. Foliaceus *apex*, nonnunquam simplex, alias multifidus, qui fructui insidet, radicum, facile hic separabilium, ac lateralium furculorum primordia in se continet, adeo ut ipse vertex easdem, quæ in tota planta sunt, partes includat, idem etiam, si obtutum acuas, in lateralibus furculis videre est. *Flores* in fructus vertice ex foliaceis tuberculis prodeunt, ex vertice oculorum ceu gemmularum exsiliences, quæ per totum, cortice excepto, ad verticem fructus, ubi foliis densioribus vestitur, ad ipsorum foliorum unguiculos extuberant; suntque florum conceptacula, quarum pedunculi florum calices, in fundo rotundi, primitus clausi, postea transgressum floribus concedentes, deciduisque floribus semet constringentes concrecentesque, evadunt; gemmulae de cætero follicosæ sunt & nonnihil ad latera compressæ, conformatae ex tribus rotundiolis, crassis, rigidiusculis ac arcte convolutis foliolis, quæ ad se invicem sunt constricta, coloris exterius sanguinei & nitentis, albicante farina, quæ ruborem obfuscatur, conspersæ, intus virides & aqueæ. Flores ex hisce gemmulis follicosis exsiliences tripetali sunt, oblongi, ad verticem rotunde cuspidati, superiori parte stricti, inferiori convoluti, ubi arcto orificio, à gemma follicosa, cujus fundo sunt inserti, tanquam à suo calice, arripiuntur. Coloris ad verticem, cæruleo saturi, inferne albicantis, petalis marcescentibus ex rubro fuscescunt. *Stamina* in illis sex, flavis, surrectis & oblongis dotata *apicibus*, quorum tria foliorum interstitiis, reliqua supra incisus e lateribus infiguntur foliis, ac fundo gemmæ follicatæ se inferunt. *Stylus* in illis eminet unicus candidus, superne bifidus, trifido apiculo, cujus quod libet interstitium bisecatur & crispatur, instar Lilii. *Flores* ex gemmis cuspidate acuto, purpureo prominent, quorum qui in inferioribus gemmulis sunt concepti citiores exsiliunt, qui in superioribus

tardiores , etiam in ipso vigore angustis osculis hiantes. *Fructus* maturus , oblongo rotundus , grandis , cortice flavo & rubescente , foliis flavescentibus & contractioribus vel obsitus , vel nudatus , oculis ceu gemmulis latioribus cavis , inanibus & magis complanatis in cortice extuberans. *Caro* ex albicante flavescit , succulenta , saporis , præ cæteris fructibus , gratissimi , acido-dulcis & vinosi ; in medio *stylus* ceu corculum est oblongum , rotundum , duriusculum , ex albo flavescentis , carne subdura , quæ lignosis intus est pertexta fibris , ex fistulosis oculis transversim incisum humorem exsudans. In fructu etiam transversim inciso oblongæ & radiosæ videntur striæ , ex corculo seu stylo medio , tanquam meditullio fructus egredientes & ad corticem excurrentes , quarum caro magis succulenta & flavescentis. Immaturus si gustetur carne sua linguam lancinat ac vellicat. E regione staminum , quæ non ipsis floribus , sed florum interstitiis inseruntur , sepulta jacent *Semina* , in quovis nodulato tuberculo , floris retinaculo , terna , singularibus cancellis , triangulari forma , quæ trigona quoque infarcitur ac distinguitur membranula , seclusa , ubi affabre factis , nerveisque catenulis rotundiusculis colligantur corollis , quarum fimbriæ eleganti rotundarum gemmularum cingulo obvestiuntur , binos inter colliculos , sicuti pinealis glandula inter cerebri nates , recumbantibus. Quoad semina ipsa , parva sunt , plana , pyriformia , ubi præcocia albicant , maturescentia apicibus fuscis dotantur , plusquam matura , castaneas fuscedine æmulantur , atque in valvulis seu cavernulis , quæ intra carnem , proxime ad corticem , seu gemmulas floriferas consitæ sunt , reperiuntur , rarius in una capsula bina ; ipsæ valvulæ oblongæ sunt , in longitudine versus medium stylum fructus ceu corculum directæ , atque in illa parte quæ magis ad stylum accedit , strictiores , ac veluti membrana nitente candida obductæ , & plures , ad singulas gemmas follicatas , exstantes. Porro observandum , quod in novellis plantæ hujus partibus profundè in orificio oculus emergere videatur candidus , constans

ex foliis supra se mutuo, tunicarum instar, convolutus, uti in bulbis apparent, suntque illa folia, quæ plantæ caulem in geniculis investiant, cujus primordium in ima parte oculi interius situm est. *Folia* in aqua *Oryzæ* cocta, & pulveri *Baliari* mixta, in potum assumpta, hydropicorum ventres purgant. *Fructus* immaturi cum *Aceto* propinati, foetum ex utero pellunt. Idem comesti abdominis ex flatibus intumescentiam corrigunt.

T A B U L A I. 2.

Prolixior hujus plantæ *Ananäs* descriptio, sub nomine *Kapa-Tsjaka*, ulteriori explicationi non indiget, omnes enim & singulæ ejus partes ab Authore quam accuratissime sunt observatæ & annotatæ. Unicum hoc addendum, plantam hanc ex America in Indiam Orientalem esse translata, ubi majores fructus, quam in nativo profert solo, atque etiam ibi aliquantulum mutata est, folia enim in India angustiora quam in America. A quinquennio singulis annis in Horto medico Amstelodamensi arte excolta, sat magnos & maturos protulit fructus. A *Casp. Bauh. in Pinac.* vocatur *Carduus Brasiliensis foliis Aloës*. A *Markgravia Nana Brasiliensis*; & ab *Hernando Matzali*, seu *Pinea Indica*: pertinet inter plantas pomiferas, antiquioribus *Botanographis* plane incognita.



Kapá-tjakka




Kadanákú aut *catevála* Lat.

കറ്റാക്കു Mal.

Cúmári

कुमारी Bram.

فخاطا و كندة Arab.



KADANKU vel CATEVALA.

TABULA III.






PLanta est arenoso & petroso gaudens solo. *Radix* penniformis, fibris ex albo flavescentibus oblongis vestita, carnosâ, aquea, filamentis lignosis, raris pertexta, saporis aquei, linguam nonnihil vellicantis. *Caulis* ex illa prodit unicus, brevis, rotundus, surrectus, intus carnosus, aqueus. *Folia* bina, decussato ordine, ex caule emergunt, quorum principia caulem amplectuntur, in latum extensa, ad longitudinem cubiti & amplius excrescentia, sensim in cuspidem stricta, valde crassa, superiori parte plana, inferiori, qua radici obvertuntur, convexa, glabra, in oris spinis viridibus, rigidiusculis munita, de cætero pulpa aquea, clara ac viscida instructa, in qua fibræ raræ, virides in longum sparsæ visuntur, saporis aquei & subdulcis. *Flores* in caulibus rotundis, qui ex radice oriuntur, ac foliosis involucris hinc inde vestiti & intus fistulosi, humidi, plures congregati proveniunt, oblongi, monopetali, superne in sex partes divisi, in cuspidem desinentes, exteriora versus nonnihil inflexi, fissi, in collo flavi, crocei, striis aurancei coloris perfusi. *Stamina* in illis sex viridi-albicantia, apicibus oblongis, surrectis, ruffis, dotata, *stylus* in medio albicat. Apud Medicos extra usum.

TABULA 3.

Aloë Vulgaris Casp. Bauhin. in Pinac. planta hæc est. Ab aliquot annis quam plurimæ hujus sunt detectæ conspecies, uti prolixius videre est apud Abrahamum Munting in Aloidario, & Hernandum Histor. Mexican. & Hermannum in Prodromo Paradis. Batav. quorsum Lectorem remittimus. In Itinerario Dom. Simonis vander Stel gubernatoris Capitis bo-

na spei, præter hæc binas adhuc species *Aloe arborescentis* inveni, summæ altitudinis & crassitie, quarum trunci incisi, egregium *Aloes* succum fundunt, qui Malabaribus ignotus, in aliis tamen Indiæ & Europæ regionibus familiaris & magni usus est.

Elettari Lat.
Des. Mal.
El C
Vas Gram.




Elettari Lat.

എല. Mal.

Elu

വേദ. bram.



ELETTARI.

TABULA IV. V. VI.



Eclivia montium, valles, umbrosa ac cæ-
nosa amat loca, solis impatiens, duodecim
circiter pedes alta, in quem finem *Tab. I.*
stirp. A. hominis appositam vides imaginem.
Radix oblonga crassescit, geniculata, albicans,
tortuosa, sursum virens, è lateribus innu-

meras fibrosas emittit radículas, quibus, veluti pedibus,
perinde ac radix *Zinziberis*, proserpit. *Caules* qui è ra-
dice emergunt, rotundi, glabri, virentes, latum ferme
pollicem suo emetiuntur diametro, stipite simplici, instar
arundinis, cujus texturam æmulantur, surgentes, albicante
vappidaque medulla, lignosis filamentis, quorum extrema,
transversim dissecta, eriguntur, instructa; ex quorum
corculis, subtilia, aquea, telæ araneorum instar, candicantia
educi possunt fila; foliorum basi, quæ superioribus radi-
cum geniculis innititur (*Tab. 2. litt. B.*) theciformibus
suis involucris (ut in arbore *Pisang* videri potest) insi-
stunt. Distracti, manibusve triti aroma spirant. *Folia*
illis *Manju-Kua* non absimilia sunt, quatuor circiter
spithamas longa, lata (vide *tab. 1. litt. B.*) viridia, para-
lellis exilibusque venis striata, odore ac sapore forti, sub-
acri, aromatico. *Costa* media in adversa parte viridi diluta,
in obversa viridior. *Flores* (vide *tab. 2. litt. E.*) uni fruc-
tigero racemo, vel radicali surculo, plures, plerumque
tres quatuorve, ejusdem oblongis foliolis (vide *tab. 2.*
litt. F.) veluti capsulis impliciti; nullus enim in foliaceo
hoc involucro conspicitur hiatus. Tegmine hoc autem
aperto tetrapetalus visui sese offert flos (vide *tab. 2.*
litt. EE.) quorum tria (vide *ibid. litt. G.*) magnitudine
conveniunt, oblongo angusta, viridi albicantia, membra-
nosa, quartum (vide *ibid. litt. H.*) quod prioribus ex ad-
verso jacet, tenui stylo (*ibid. litt. I.*) lingulaque (*ibid.*
litt. K.) donatur, paulo latius ac minus oblongum est,

interius situm ac viride; Lingula litt. K denotata, oblongo-angusta est, crassiuscula, in interiori facie, quæ intimo foliolo ex adverso opponitur accumbitve, sulco striata, in supremo apice bifida, dilute rubescens, suoque sulco exilem, candicantem stylum litt. I, qui in tenue planumque definit capitulum, recipit. *Floris* vigore cessante complicantur petala, fructuum apicibus perpetim insidentia, *calyxque* in fructum intumescit, (vide litt. M) qui ubi adoleverit in orbem distenditur, convolutis floris foliis etiamnum comatus, (vide litt. N) qui desiccatus talem ut litt. O formam refert. *Fructus* radicalibus fructipromisque racemis appendent, qui uvis & forma & sapore haud perperam assimilantur, orbiculati enim sunt & grate subacidi, viridi, crassiusculo, carnosio, aqueoque cortice obducti, striis admodum tenuibus juxta longitudinem pertexti, in tres distinctos dividuntur loculos cancellatim distinctos, ita ut quodlibet intersepimentum, in sui medio, membranacea fibrilla (vide tab. 2. litt. B) etiamnum, sed levi ingressui bisecetur, sicque seminum conceptacula efficiunt: adeo ut sex ordinibus, combinata, triangularia, pressis planisque lateribus fructus, copiose infideant grana aromatica (vide litt. L) quæ medio stylo trigono, (vide tab. 2. litt. C) cui, mediante membranacea septa, affiguntur, cuspidibus suis adhærescunt. In aprico fructus hi exsiccantur solo, ubi cortex, qui primo crassius viridisque, extenuatur & ex ruffo albescit; suntque ipsissimum *Cardamomum*; non seruntur neque plantantur, sed post sylvarum comburia, sub omnigenarum arborum plantarumque cineribus progerminant. Porro observandum quod ex radicum geniculis sub terra, plurimæ prodeant *gemmae* cuspidatae, viridescentes, quæ in furculos (vide tab. 2. litt. D) sesqui spitham longos excrescunt, suntque illi succincti, geniculati, in articulis foliaceis vel membranaceis gaudentes tegumentis, quæ sicca ex albo rufescunt, & è commissuris laterales, simplicesque pedunculos eructant, qui, sub foliosis, capsiformibusque tegumentis (quibus arcte vestiuntur) florum, fructuumque germina recludunt.

Tres

Kúa Lat.

കുമാ Mal.

Kúa

कुआ Bram.

قحوا Arab.



K U A.

T A B U L A V I I.



Va, Bramannibus *Acua*, proprium & commune omnium plantarum nomen est, quæ ad species Zinziberis referri debent, suntque numero octo. *Kua*, *Tsjana Kua*, *Mallan Kua*, *Manga Kua*, *Mangella Kua*, *Intsyi Kua*, *Katou-Intsyi Kua*. *Mala-Intsyi Kua*. Prima species omne amat solum, præsertim arenosum, in quo sua sponte provenit & progerminat. *Radix* ab una parte transversim excurrit, alba, crassa, tuberosa, hinc inde tenuioribus & fibrosis radiculis instructa, densa, multisque capillis albicantibus pertexta, cortice glabro; in longitudinem se per tubercula dispergit, ad crassitiem duorum circiter digitorum, & spithamæ longitudinem, in ramos divisa, aqua limpida referta. Sapor acris est, linguam vellicans, amaricans, aromaticus. Odor fortis est & gratus, perinde ac si multa aromata inter se essent permixta. *Folia* oriuntur ex radicum extremitatibus ad longitudinem cubiti, & latitudinem in medio duarum spithamarum; antè acuminata, circa pedem angusta, *costa* eminente instructa; illa multas emittit laterales, transversim antè excurrentes, æquali distantia, in extremis oris disparent, ubi subtilioribus venulis marginem folii amplectuntur; interior pars folii aliquo modo complicata est & reflexa, futuris notata. Color in parte interiore fuscus est, in exteriori dilutior. De cætero folia glabra sunt, nitentia, aquea. *Caules* sesquipedales sunt, viridante medulla pleni, sed nulli in illis conspiciuntur furculi; sed è radicibus, scapus erigitur peculiaris, prælongis aliquot foliaceis squamis, scapum arctissime ambientibus obtectus; quæ folia digiti longitudinem superant, antè in latum extensa, & exiguâ cuspide ad se invicem contracta, extremitates à scapo reflectunt, glabra sunt, in longitudine tenuioribus venulis

instructa, quæ, nisi frangantur, neutiquam videri possunt; inferiora viridia sunt, media flava, superiora rubra, purpurea, dilute cærulea, summa pene candicantia, aspectui jucunda, odoris grati, sapor ut ille radicis. *Flores* ex squamarum interstitiis, duo vel tres simul proveniunt, campanulas referentes, inferiori parte & intus sub albi, tenui, transparente membrana conclusi, hextapetali, petalo superiori oblongo pellucido, galeæ instar, erecto, flavi sunt & albi, complicati, & vix videntur nisi totus flos à caule divellatur & a se invicem separetur, ubi unum illorum reflexum deprehenditur ad marginem fimbriatum; in medio *filamentum* sese prodit cuspide instructum, draconis quasi caput & aviculam alatam erecta cauda referens. Odor gratus est, è calice sed fracti, & intra digitos contusi, foliorum æmulantur odorem, saporis subamari. *Capsulæ* seminales rotundiolæ sunt, & depressæ, grana continent cineritia, ut illa *Tsjana Kua*, sed raro inveniuntur. *Radix* diu superstes est, folia decidunt, mense Julio & Augusto denuo progerminat. *Radices* raspatæ, aliquoties lotæ, pollinem reliquunt, ab indigenis multum æstimatum, qui pultem ex illo conficiunt. *Radix* contusa & succus recens epotus, omnem intestinorum ardorem sistit, renes purgat, fluxum album inhibet, gonorrhæam sanat, sanguinem purgat. *Foliorum* succus hydropicis propinatur, intumescentiam abdominis aufert, modice laxat, viscidam intestinorum pituitam expurgat.

T A B. 7.

Kua secundum sententiam Cl. Vir. Pauli Hermannii est *Zerumbeth Garzii* ab Horto, cujus descriptio, ut & illa *Arabum* admodum obscura, à *Cingalensibus Walinghuru*, id est, *Zinziber sylvestris* appellatur, *Malabares* dicunt *Kua*. Illa Hermannii cum Auctoris nostra ut plurimum convenit.

T S J A.

Tojána-lúa. Lat.

உண்கலம் *Mal.*

Ponró.

पोतो *bram.*

جيانا فحاء *Arab.*



TSJANA-KUA.

TABULA VIII.



Ramannes dicunt *Ponvo*, secunda species omne solum amat, præcipue umbrosum. *Radix* alba, in multos tuberos divisa & prorepens, fungosa, aquea, fibris quamplurimis pertexta, aquea, tenella adhuc viridis est & albis capillis obsessa; *Cortex* demi non potest; vetustior facta & fracta, multæ fibrillæ exinde in longum extrahuntur telæ araneæ instar. *Sapor* aqueus est & dulcis ut ille *Cucumeris*, leniter Zinziber spirat. *Surculi* diversis in locis è radicibus progerminant, ad altitudinem trium quatuorve pedum, digitumque crassi evadunt, rotundi, sanguineo rubri, glabri, nitentes, arundinacei, geniculati, simplices, sine ramis, intus virides & aquei. *Sapor*, cum odore, ut ille radicis. *Folia* oblongo angusta, duas spithamas longa, antè acuminata, in medio lata, prope circa furculum annexa, ubi pedes furculum obvolvunt ac obtegunt, in parte adversa *Costa* eminet, in obversa striantur, laterales costæ transversim marginem folii petunt, ubi oblitterantur; multoties introrsum sunt convoluta, mollia, nitentia, viridia, admodum aquea. E cacumine furculorum capitulum seu tuberculum exoritur, instar *mali punici*, pyriforme, ex multis corallo-rubris gemmulis conflatum, quæ singulæ lata basi, medio stylo annectuntur. E gemmis prodeunt *flores* trifariam divisi tetrapetali, ephemeri, candidi, campanulæ formes, in vertice aliquantulum aperti; quartum petalorum maximum est & reflexum, in cujus cavitate quintum reperitur, admodum reflexum & in quartum recumbens, e regione lingula reperitur in pede floris radicata, apice flavo, de cætero alba; ipsi flores admodum aquei sunt & in sole liquefiunt, è calice suavem admodum spirantes odorem, non autem ex ipsa substantia, quæ odoris & saporis est expers. *Calix* è tribus constat foliis rigidis, lignosis,

ro-

rosaceo rubris, intus cæruleis, quæ siccata fusca evadunt; trigono ac rotundiolo insistant globulo seminali, interse-
pimento in tres partes diviso, ubi *semina* seriatim, & se-
cundum se invicem disposita, membrana media annectun-
tur, triangularia, ut illa *Cardamomi*, primo cærulea, dein
fusca, quando capsulæ seminales etiam trifariam aperiun-
tur; contusa Zinziber spirant, saporis admodum exigui,
intus alba. Diu admodum superstes hæc planta est, radix
enim proserpit & hinc inde novos furculos emittit, præ-
sertim mense Aprili & Mayo. Cum Zinzibere mixta in
colica passione adhibetur. *Succus* dolores, ulcera, &
aurium tinnitum aufert, auditum juvat, omnem fluxum
cerebri tollit & vertiginem.

T A B U L A 8.

<p>Secundum meam sententiam <i>Tsjana Kua</i> illa radix est, quæ apud <i>Matthiolum</i> in <i>Diosc. lib. 1.</i> <i>cap. 15.</i> pro <i>Costo Arabico</i> <i>Dioscord.</i> habetur, & est <i>Costi</i> quoddam genus Zinzibri radici simile <i>Clusii</i> in <i>Garc.</i> Radix quæ in officinis prostat & divenditur, cum</p>	<p>descriptione nostri Authoris quam maxime con- venit; est enim saporis vappidi, substantiæ fibrosæ & capillatæ. Sæpius illam inter Radices Zedoa- riæ officinarum inveni. Germani illam pro vero <i>Costo Arabico</i> 1. <i>Theriacali</i> adhibent.</p>
---	--





Malankua lat.

മലങ്കുല മാ.

Ben - tsjapó

ബെന്‌ട്‌സാപോ

لَام فَخْوَاء Arab.

MALANKUA.

TABULA IX.



Alankua, quasi diceret *Kua Montana*, tertia species est *Zinziberis*, secundum Braman-
nes *Ben Tsjapo*, elato, pingui & limoso gau-
det solo. *Radix* bulbosa est, extus cineritia,
coriacea membrana obducta, intus alba,
densa, aquea, undiquaque multis fibris ob-
fessa, capillata, digitum crassa, cui quamplurimi oblon-
go rotundi bulbi, bini & bini, trina supra se annectuntur
serie, glabri, hinc inde minutissimis capillis instructi,
denfi, perinde ac *Bulbocastana*, quos nomine *Kourka* insi-
gniunt, intus pingues & mucilaginosi, *Zinziberis* odorem
& saporem spirant, linguam minus vellicantes. E sum-
mitate radice *calix* oritur, albus & membranaceus, instar
ille *Croci*, cui flores includuntur quaterni vel quini, ex
fundo calicis longis petiolis prodeuntes, tripetali vel etiam
hexa petali, quorum tria, digitum longa, stamen lata,
reliqua petala, sive ipsum florem obtegunt, flore jam
aperto, supine recumbentia; duo ex reliquis longa sunt
& angusta, in acutum desinentia, tertium illis ex adverso
est, bifariam divisum, ita ut ipse flos tetrapetalus videatur,
mixti coloris est, ex cæruleo albo, purpureo, rubro, flavo;
duo reliqua maxima parte alba sunt, ita tamen ut dicti co-
lores etiamnum, sed obscuri videantur; ex eodem cali-
cis fundo simplex progreditur *filamentum* purpureum,
quod cornuta & flava eminet lingua; gratissimi hi flores
sunt odoris, *Violas* & *Lilia* longe superantes; ante folia
e terra erumpentes, quibus deciduis *calix* intumescit,
capsulas seminales efficiens. *Folia* cum illis *Kua* in totum
conveniunt, excepto quod caules & surculi non sese ita
erigant, cubiti altitudinem non excedant, sapor ut ille
Zinziberis, odor idem. Semel quot annis floret hæc planta
tempore pluvioso, diu superstes est, in proprio nempe solo,
quia bulbi semper de novo progerminant. In Malabaria

ad decem gradus altitudinis versus Borealem partem Lineæ Æquinoctialis, pleno videbatur flore, qui mense Junio ejusdem anni Bataviæ, ad sex gradus Lineæ Æquinoctialis versus Austrum exsiccabatur, ubi mense Decembri de novo florebat, tum enim illic loci pluviae decidunt. Cum ex Indiis Europam peterem, septimestri tempore, ter florebat, ac toties folia permutabat, donec mense Augusto tota consumpta deprehenderetur. Ratio, quia tam brevi tempore toties soli exposita, terra non tantum poterat subministrare alimenti, quantum quidem ad ulteriorem conservationem indigeret; quod & in eodem itinere in diversis aliis plantis accidit & observatum est, quam plurimum enim fit, ut sub linea æquinoctiali, aër nubibus obtegatur, unde pluviae, quæ regiones sub Zona torrida frugiferas faciunt, sine illis enim omnia comburerentur & desiccarentur. Tota planta in formam unguenti redacta, mirum in modum vulnera recenter inflicta sanat; intus sumpta sanguinem in corpore coagulatum, & omnem purulentam materiam consumit; est & unguentum oculare. *Succus* radicis omnem pituitosam & quasi hydropicam materiam è manibus, pedibus, atque ipsis etiam articulis, quamvis quasi emortui, & extra omnem naturalem motum videantur abigit.

T A B U L A 9.

Malan Kua à Cingalensibus *Maha Kaluwa* vocatur. *Hermannus* in *prodrom. Parad. Batav.* dicit *Colchicum Ceylanicum* flore *Viola*, odore & colore *ephemero*, & hoc ob similitudinem florum. In officinis duplex species *Radicis Zedoaria* invenitur; una nomine *Zedoaria radice longa*, alia *Zedoaria radice rotunda*, vel Belgicè *Blok Zedoar*. Meo judicio doct. Dom. *Jacobus Breynius* in sua *prodromo secund:* non male judicavit hanc *Malan Kua*

esse *Zedoariam radice rotunda*. In Horto Medico Amstelod. has radices è terra effodi, quando folia jam perierant, & exsiccavi, quæ cum illis *Zedoaria rotunda*, quoad saporem & odorem, in totum conveniebant; ita ut nullus dubitem quin una sit & eadem, quamvis *Lobelius* in illa stet sententia, longam & rotundam *Zedoariam*, radices unius & ejusdem esse plantæ; sed ignoscendum viro, nunquam enim has virentes vidit.


Manja-kua Lat.

മഞ്ചകുവ mal.

Dari-kua

दरिका bram.

مانجا فوا arab.



M A N J A - K U A.

T A B U L A X.



Q Uarta species, & minima *Curcumæ*. Malabares *Manja* dicunt, Bramines *Davikua*, Lusitani *Raiz do Zafraõ*. Radix bulbosa est, pollicem & quod superest crassa, extus glabra, nitens, tenuissima membrana quasi obvelata, intus flava, densa, carnosa, transversim dissecta, variis auranceis, rubris, flavis circulis notata, sine ullis, quantum animadverti possit venulis vel nervulis, non admodum longa, exterius multis radicibus capillaribus instructa, fortissimi saporis & odoris, *Crocum* & *Zinziberem* æmulantis. Folia cum illis *Kua* quam maximè conveniunt, sed respectu longitudinis paulo latiora, grati odoris, saporis subamari. Flores illic loci proveniunt, ubi folia se aperiunt, sex vel septem simul, sine longis petiolis, monopetali, difformes, quadrifariam divisi, albi, circa pedem aliquantulum rubri, odoris expertes, saporis amari, teneres sunt & aquei, intra biduum vel triduum pereuntes. Semina è pede calicis proveniunt, ut illa *Tsjanakua*, non tam magna sunt, nec capsulæ ita trigonæ, sed plana, intra membranulam juxta se sita, rarissime ad maturitatem pervenientia. Semel quot annis hæc planta folia profert & fructus, mense nempe Aprili & Mayo, diu superstes est, semper enim novi furculi è radice progerminant. Succus radicis dysenteriam & immodicum mensium sistit fluxum, vires corroborat, spiritus reficit, sanguinem purgat, mixtus cum aliis medicamentis, inveteratos ex frigore sanat morbos.

T A B U L A IO.

Ut *Zedoaria*, ita & duæ inveniuntur species *Curcumæ*, experientia id ita testante; in officinis enim duæ dividuntur species, una nomine *Blok* *Curcumæ*, cujus radix rotunda, sed non tanti valoris ac vigoris ut illa alia. Nos diceremus *Curcumæ radice rotunda*, & est ipsissima quæ à nostro

Autore describitur, sub nomine *Manja Kua* Doctiss. Casp. Baubin. in *Pinac.* etiam *longa* & *rotunda* mentionem facit *Curcumæ* sed perinde quasi unius & ejusdem plantæ radices essent, cum tamen contrarium apud nostrum constet Authorem.

Manjella-koua Lat.

30033 Mal.

Aladi

हळदी bram.

سُجْنَالَة Arab.



MANJELLA KUA.

TABULA XI.



Anjella Kua quinta species, Bramannes dicunt *Alady*, vera *Cucuma* est, omne amans solum. *Radix* ut illa *Zinziberis* bulbosa est, duos digitos crassa, extus eleganti flavo colore tincta, intus rubeo aqueo, qui etiam flavescit, densa, carnosae, nullis circulis interstincta, sed ejusdem ubique coloris, multis minoribus radiculis, quæ capillatis fibrillis obducuntur, instructa, perinde ac illa *Manja Kua*, gratissimi odoris & saporis, ast fortioris. *Folia* proveniunt ut illa *Kua*, sed illorum caules seu pedes, postquam à stipite recesserint, longiores sunt. *Costulae* quæ ex medio folii utrimque transversim ad anteriora excurrunt, propius junctæ & subtiliores sunt. *Folium* ipsum majus est & dilutius. *Flores* in vertice junctorum oriuntur foliorum, forma ut illi *Manja Kua*, etiam *semina*, ita ut inter hanc plantam & *Manja Kua* exiguum intercedat discrimen, excepta magnitudine, & præstantiori virtute, odore & sapore. Non tantum in desertis reperitur, sed etiam in agris excolitur, & hoc lucri causa, nulla enim familia est quin illis inter edulia utitur. Europæi illic loci degentes, *Croci* loco est. Etiam in tingendis linteis adhibetur. *Succus* cum *radice* contusus vel levigatus orificium reficit, halitum gratum facit, exhilarat, melancholiam pellit, sanguinem purgat, venerem excitat, ventriculum & cerebrum confortat, obstructions renum, vesicæ tollit, menstrua provocat, leniter alvum laxat, hydropis in curat. Brevi, omnium consensu planta præexcellens est & excellentissimis præditis virtutibus.

TABULA II.

Planta hæc ab Authore nostro descripta, vera est & ipsissima *Cucuma*. Ab aliquot annis in *Horto Med. Amstel.* illam excolui, & fateor ad amissim cum descriptione hac convenire. Distinguitur à *Kua* in illis, quod foliorum caulis sit dilutior. *Bontii* delineatio nihil valet, figuram enim *Canna Indica* pro illa ponit. Delineatio *Do. Hermannii*

etiam deficit, & cum illa nostri Authoris minimè conveniens, præsertim in *progressu floris*, qui multo melius ab Authore nostro est observatus. *Radix* hæc quæ apud Indos in magno est usu, *Borri-Borri* ab illis vocatur, reliqua cognomina videri possunt apud *Bauhinum* in *Pinac.*

Junci lat.
ഇളി mal.
هينجى arab.
आले bram.



INSCHI vel INSCHI KUA.

T A B U L A X I I.




Sexta species; Bramannes dicunt *Alè*,
 ipsissima planta est, quam nos *Zingiber*
 vocamus, quæ iterum in tres dividitur
 species. *Inschi*, *Katou Inschi* & *Mala Inschi*
Kua. *Inschi* tantum dicit ac fervidum,
 calidum, urens, quia reliquæ *Kua* species
 linguam non ita pungant nec vellicent. Planta est
 excrescens ad altitudinem duorum triumve pedum.
Radix bulbosa est, multis tenuibus, curvis ligneis,
 capillatis fibrillis sese terræ affigens; intus ex flava albescens,
 densa, multis filamentis & nervulis in longitudinem
 pertexta, sæpius tres pollices lata, in medio crassa,
 spithamam & quod superest longa, sed tum facile frangitur,
 quæ causa est, quare exsiccata, rarissimè tam magna
 videatur. Sapor dulcamarus est, fervidus, omnibus pene
 notus. *Surculi* multis in locis è radice progerminant,
 digitum crassi, arudinacei, geniculati, intus virides,
 corculo humido instructi, rotundi, glabri, nitentes,
 simplices, non divisi, ubique pede calici formi foliorum
 ita obvoluti, ut caulis in totum ab illis obtegatur, quæ folia
 in solo vertice prodientia, in processu surculi subsistunt,
 illic loci ubi surculo inseruntur, arundinaceos circulos
 relinquentia. Saporis & odoris sunt aquei, fortis, grati.
Folia spithamam longa, duos digitos lata, pedetentim
 in acutum desinentia, in adversa parte *costa* eminente
 instructa, quæ in recta striam relinquit, fusco viridia,
 glabra, nitentia; fortissimi & gratissimi sunt odoris,
 saporis dulcamari, linguam non ita vellicantia quam
 quidem ipsa radix. *Flores* ut illi *Tsjana Kua* in vertice
 surculi proveniunt, sed in illo differunt, quod ex tubere
 florifero non ex gemmulis, sed ex cochleato cavis consistit
 foliolis. *Folia* hæc simulatque ab aëre afficiuntur, illic loci
 primò sunt viridia, deinde corallorubra, at ubi se ipsa ob-

obtegunt, flavescentia, quæ tandem etiam rubescunt, squammatim optima serie disposita, glabra, nitentia. *Flores* infra cochleata tuberis proveniunt foliola, medio stylo affixi, cui etiam foliola annectuntur, monopetali, difformes, quadripartiti, viridi flavi, in principio alba membranula inclusi. Unum petalorum longissimum est & erectum, cavum, introrsum inflexum, duo reliqua angusta sunt & minora, extrorsum reflexa, quartum brevius est & latius, bisectum, cum margine rubro, flavis punctis aspersum. In medio ex pede calicis tenue, album prodit *filamentum*, cujus *lingula* oblonga, flava. Odor admodum exiguus est, sed contusi cum illo foliorum convenit. Ultra diem aut biduum non supersunt, citoque pereunt. *Semina* sequuntur flores, tenui, alba, interstincta membranula inclusa, ubi inordinata serie minutissimis fibrillis stylo annexa, & cochleato cava foliola tuberis elevant, oblonga, depresso rotunda, ab una parte parum convexa, in longitudine paralellis striis exarata, extus nigra, nitentia, intus alba, oleosa, pingui medulla. Odor & sapor ut ille foliorum. E radice, per simplicem destillationem, sæpius oleum collegi, ab omni parte quoad saporem & odorem, cum radice conveniens, sed non ita fervens nec ardens, de cætero valde limpidum, transparens, rubrum, aquæ innatans. Mense Aprili, in terra bene exculta, feritur hæc planta, è terra eximitur, replantatur atque ita excolitur; annua è terra eximitur, per quatuordecim dies in sole exsiccat, cineribus ex ligno, vel etiam calce aspergitur, atque sic conservatur, alias tineæ & corruptioni admodum est obnoxia, tum vel exsiccata vel saccharo condita ubique locorum transmittitur. Arenosum & non bene excultum respuit solum, & plusquam annua ligneis filamentis adimpletur. Etiam in sylvis & desertis reperitur, diuque sua natura superstes est, sæpius bis & pluries folia renovat, quæ ut plurimum mense Januario & Februario exarescunt. Præcipuus usus in radice est, quæ præterquam quod in eduliis adhibeatur, etiam intus sumta astmathi, tussi, pituitæ viscidæ, nausæ, ven-


ventriculo male disposito conducit, exterius applicata artuum dolores, chiragram & podogram tollit. Cum aqua contusa & oculis infusa, vertiginem sanat, illam nempe, quæ post partum mulieribus non bene per menstrua purgatis, accidit, quæ nisi in tempore curetur, epilepsias, paralyfes, manias, imo ipsam mortem, in illis regionibus sæpissime producit.

T A B U L A 12.

Inſchi vel Zinziber tam accurate & perfecte ab authore nostro est descriptus & delineatus, ut ulterius quid addere supervacaneum duxerim.



Kattu-jnschi Lat.
കടകിട Mal.
فقط ميني Arab.
कोलीजणे bram.



K A T O U I N S C H I K U A.

T A B U L A X I I I.



Ramannes dicunt *Kolinyane* septima species, quasi diceret *Zinziber sylvestris*. In totum cum præcedenti convenit planta, sed odor neque sapor tam fortis nec aromaticus, omnes etiam partes multo majores sunt; folia illis *Manja Kua* per quam similia sunt.


Etiam vires pene eadem sunt ut illæ *Inschi Kua*, sed non tanti valoris neque præstantiæ. Indigenæ, lucri causa, hanc cum præcedente commiscent. Sed notandum quod hæc neque ex semine producatum neque excolatur, atque ideo merito pro sylvestri habenda.

T A B. 13.

Zinziber est sylvestris. A *Pisone* in *Mantissa Aromat.* Cap. 12. describitur & ab eo *Zinziber Mas* vocatur, ab *Hernando Anchoa*.



Mala-jntschikua lat.
മലയ്ക്കു മല.
مَلَجْ مَيْتْشِي Arab.
कोलिउणे bram.



MALAINSCHIKUA.

T A B U L A X I V.



*O*ctava *Kua* species & tertia *Zinziberis*; Bramannes dicunt *Giri Kolinjane*, quasi *Zinziber montanus*, altitudine omnes priores antecedens. *Radix* cum illa *Inschy* convenit, sed duplo crassior, aquæa, vappida, *Zinziberis* aliquo modo odorem & saporem

spirans. *Surculi*, ortus, *Folia*, ut *Katu Inschy*, sed hæc multo longiora & latiora, sapor & odor cum illo radicis convenit. *Caulis florum* quæ medulla est plantæ, ad cubiti altitudinem sese erigit è vertice foliorum, rotundus & undiquaque multitudine florum obtectus, brevibus petiolis brevibusque ramulis, quaterni vel quini, cauli affixi, qui glaber, viridis & nitens; grati & jucundi odoris *Fructus* ex pede florum proveniunt, oblongo rotundi, formam referentes seminum arboris *Kavalam*, sed paulo longiores, primo virentes & glabri, deinde rubri & nitentes, cortice crasso, membranaceo, uvarum instar, intus densa carne vel medulla, quæ ruffa est, intra quam concluduntur *semina*; duo vel tria numero, alba, tenui membrana inclusa, oblongo rotunda, ab una parte rotunda, dura, nigra, nitentia, intus alba, oleosa & unguentosa, *nucleus* amigdalum refert; saporis amari, odor ut ille *Zinziberis*. Provenit ut *Katu Inschy*, non excolitur neque in eduliis adhibetur. *Succus* è radice recenti expressus, intus & extus Podagricis datur; cocta radix dolorem capitis aufert, in vino macerata omnes artuum cruciatus è frigore ortos tollit, in pulverem redacta, cum succo *Raphani* permixta, & epota, calculos diminuit, arenulas è renibus deterget, mulierum colicam sistit, menstrua provocat; succus cum vino coctus lochias promovet, sanguinem purgat; & efficacissime secundinas expurgat.

T A B U L A I 4.

Inter alias etiam hanc plantam ex Ceylane consecutus sum, quam in *Horto Medico* excolui, in cujus Catologo a me vocatam invenies *Arum Polyphyllum*, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum *Ceylanicum*, caule glabro, viridi-diluto, maculis albis notato, majus & elatius.

Parua-kelangu Lat.

പറുവ കളങ്കി Mal.

بجَارُوعٍ فَالَانْفُجُ Arab.

आळ Bram.



PARUA-KELANGA.

TABULA XV.



Plantula est altitudine duarum spithamarum, nascens in aquis minus profundis. *Radix* glandulosa est, intus albicans & aquea, plurimas radices fibrosas, quæ prius albicant, dein flavescent, ejiciens, saporis expers. *Caules* tenues, simplices, fistulosi, alii triangulati, alii rotundi, virides, inferius albicantes. *Folia* ex summitate cauliculorum triangulorum recta prodeunt, ex singulis unum, ligonem referunt, oblongo angusta, interius latiora, circa petiolum rotundis oris antè in cuspidem contracta, superficie plana, contextura lenia, mollia, mediocris crassitie. *Costa* in adversa eminet, ut & venulæ tenues, utrinque duæ; quibus in longum striantur; *caules*, triangulati è quibus folia proveniunt, in interiori foliorum parte, planiores. *Flores* congregatim ac velut spicatim, in summitate priorum, rotundorum, viridum cauliculorum videntur, albicantes, sub purpurei; conflati ex *staminulis* aliis crassioribus, aliis tenuibus, quæ *apicibus* purpureo-rubris dotantur, quorum petala rotundiola, parva, primum scutellatim posita ac stamina obtegentia, sed cauliculi, quem cingunt, summitate excrecente, à se mutuo dissita; temporis progressu tam petala quam staminula viridescent, quæ posteriora in *gemmas* mutantur rotundas, virides, spiculo munitas, in quibus *semina* parva, oblongo rotunda, primum viridia, dein nigricantia. Addendum in super quod plantula hæc è sua radice glandulosa à latere, similem radicem producat, qua propagatur. In Medicina nullum obtinet usum.

TABULA 15.


A nemine cum descripta sit hæc planta, meo judicio vocari debet *Plantagini affinis Indica*, floribus sub purpureis, radice glandulosa.

NIR-

Nir-tsjembu Lat.

நீர் த்செம்பு Mal.

نیر جھمبہ Arab.




Nelenschina minor Lat.

நெலெச்சினா Mal.

Toro

तोरो Bram.

نیلان جھمبہ Arab.



N I R - T S J E N B U.

T A B U L A X V I.



PLanta aquatilis est. *Radix* aquosa, carnosæ, albicans, plurimis fibris albicantibus se fundo aquæ affigens. *Folia* caulibus, qui ex radice exoriuntur, ac viridi albicantes, molles, & intus fungosi sunt, surrecta insident, superiori parte viridia, inferiori, ubi multis eminentibus obducuntur *costis* rubro cærulescentia, hastiformia, crassiola. *Flores* caulibus, qui ex radice oriuntur, insident in propriis suis ac viridibus involucris, suntque ligulæ oblongæ, rotundæ, albicantes, carnosæ, quæ pedunculo strictiore, ex crasso, rotundo, rubro, ac bulbulis scabroso nodo, emicant. Nullius usus in Medicina.

T A B U L A 16.

Arisarum mihi hæc planta est *Indicum Aquaticum cum pistillo rubro, pediculo globulo adherente.*

N E L E N S C H E N A M I N O R.

T A B U L A X V I I.



PLantula humilis, nascens in arenosis & petrosis. *Radix* fibris, oblongis, albicantibus vestita. *Folia* in petiolis versus inferiora incurvatis, candidis, aqueis, theciformis cavitatis, superiora versus viridibus, proveniunt; oblonga sunt, angusta, obtuso cuspide, sinuosa, utrinque nonnihil nitentia. *Costa* crassa, albicans, cum suis venulis, in adversa parte eminent. *Florum* loco, in oblongo, folioso, theciformi, viridi diluto involucro, cujus collum inferius inflatum est & rubescit, & hiatu è vertice versus inferiora, se magis magisque aperit, reconditus est *stylus* oblongus, rubescens, superiori parte *capitulo* flavo, inferiori in colli foliacei parte gemmulis oblongis, flavoruffis obsitus, paulo infra capitulum nodo

theciformi, qui oblongus & gemmulis quasi granulatus, incarnatus & sub purpureus est, circumdatus. Potio ex foliis præparata colicos mitigat dolores.

T A B U L A 17.

Ego dicerem *Arisarum indicum petraeum humile*, radice fibrosa, pistillo rubro adherente, granulis purpureis.



Schéna Lat.

செனா Mal.

جسنا Arab.

சசுச bram



S C H E N A.

T A B U L A XVIII.



Quatuor hujus plantæ sunt species. *Schéna*, *Nelenschena*, *Cattu-Schena*, *Mulen-Schena*. Prima Bramannibus dicitur *Surno*, arenosis gaudens, altitudine trium quatuorve pedum. *Radix* prægrandis, plana, rotunda, spithamam ferme longa, crassa, cubitum pene lata, superiori parte, circa caules, fibris albicantibus, in orbem circumdata, intus densa, succulenta, unctuosa & ex albicante subflava carne, saporis aquei & nonnihil pungentie, in edulis est & in foris divenditur. *Caulis* è radice, ubi candidus est, exsurgit unicus, superne in tres ramulos, qui hinc inde furculos minores emittunt, & in duos magis crassiores aliquando divaricantur, divisus; suntque & caules & ramuli teneri, molles, glabri, viridi diluti, albicantes, undulis viridi fuscis variegati, intus humidi, pulpa albicante, fungosa, humorem ex fistulis exstillantes clarum, subrubescens, qui in manum incidens, eam nonnihil pungit, & in aëre inspissatur. *Folia*, quæ ramos furculosque caulis, in quos divisus est, investiunt, oblongo rotunda sunt, angusta, superius cuspidata, viridi clara, ex inferiori parte caulis prodeuntia, caulem angusta lacinia, velut alatum reddentia, linguam acriter pungunt ac lancinant. Nervuli è *costa* media densi, obliquo ac parallelo ductu, exeunt, qui à margine reflexi, limbulum illic loci relinquunt, una cum *costa* in adversa eminentes & rectam partem striantes. *Flores* filii sunt ante patrem, proveniuntque in capitulo oblongo, quod cum foliolo, crasso, albicante, intusque subrubescens involucri è radice exsurgit, suntque *gemmæ* flavescentes capitulo circumpositæ, quarum inferiores majores, superiores minores: illis deciduis caulis, foliis vestitus, prodit. Tempore pluvioso tantum reperitur, æstivo cum inferiori parte

parte radicis emoritur, cujus superior pars, fibris circumdata est & remanet, & denuo in crassam excrescit radicem. *Bulbus* in partes discissus, in sole exsiccat & pulverisatus cum lacte vaccino atrabilariis propinatur.

T A B U L A 18.

Ex Ceylane plantam hanc consecutus sum, quam etiam in Horto Medico excolui, in illius Catalogo à me vocatur *Arum Polyphyllum*, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, *Ceylanicum*, caule glabro, viridi diluto, maculis albicantibus notato, majus & elatius.



Amorpha fruticosa
(prax.)

Pars II. Tab. 19.



Mülenschena lat.

മുളണ്ടേന മാ.

مُولَحْدَجْنَاء Arab.

कात्रचोरुसु ग्राम.

MULENSCHENA.

T A B U L A X I X.



*S*pecies *Schena*; lingua Bramannum *Calerisurno*, cæteris elatior, ad altitudinem ferme quinque pedum assurgens, maxima ex parte cum *Schena* conveniens; sed *radix* grandior est, *caulis* crassior, pene in plures ramos bivaricatus, numerosioribus foliis vestitus; in cortice, qui exterius viridi dilutus, albicans, undulis, viridifuscis perfusus, pulchrè variegatus, densis asperisque & extuberantibus gemmis obsitus, incisus uberiores aquæ copiam exstillans; linguam acerrime pungens & lancinans. *Radix* contrita & cum capræ lacte assumpta, vires corroborat.

T A B. 19.


In Catalogo Hort. Med. Amstelod. à me vocatur *Arum Polyphyllum*, *Dracunculus* & *Serpentaria dictum*, Ceylanicum, caule aspero, maculis viridifuscis, & virididilutis albicantibus pulchre notato. Ab Hermanno in Prodrom. Parad. Batav. *Arum Polyphyllum*, *Dracuntium* & *Serpentaria dictum*, folio ramoso, *Paonia* instar, caule aspero, Ceylanicum.

Nelenschina major Lat.

നലഞ്ചേന Mal.

نَعْلَم جَهَنَامِ Arab.

சாகுtram.



NELENSCHENA MAJOR.

TABULA XX.



Ecunda species *Schena*; Bramannes dicunt *Cayeri-Surno*, nascitur in arenosis, udo maxime gaudens solo, altitudine pedis. *Radix* alba, pugnum crassa, densa, aquea, plurimas albicantes & barbatae fibras, quæ postmodum flavescent & in annulos corrugantur, emittens, linguam acerrime urens, ad propagationem sui similis plantæ, novellos ex se oculos edens. *Cauliculi* plures ex radice proveniunt, teneri, rotundioli, interius striati, virides, ad radicem albicantes ac follicosi, quibus folliculis se mutuo involvunt, spithamam plus minus longi. *Folia* è summitate caulium protenduntur, oblonga, ligonem oblongum ac rotundo cuspidatum, referentia, rotundis oris in cuspidem contracta, tenuia, plana, viridi fusca, in parte adversa maxime nitentia. *Costa* media cum transversis in adversa parte nonnihil eminet. *Flores* in propriis cauliculis, qui inter foliorum caules ex radice exsurgunt, videntur, rotundi, virides, venulis in longum striati, intra folliculum caudatum *stylum* oblongum recondentes, cujus pedi circumponuntur; illorum petala albicant, antè bifida, interiora versùs inflexa, quorum ora rubrum referunt colorem. *Semina* in inferiori parte pedis styli, qui plurimis nodulis concinne ad se invicem positus est circumdatus, è nodulis erumpunt, oblongo rotunda, primo viridia, ea parte qua extra nodulos emicant, contractiora & albicantia. Non nisi tempore pluvioso hæc planta reperitur. *Bulbus* in pulverem redactus, cum butyro & saccharo sumtus alvum adstringit.

TABULA 20.


Species est *Ari minoris*, & forsan *Arum minus Ceylanicum Sagittaria folio*, Herman. Prodrum. Paradis. Batav.

Kátú-schéna Lar.

കാട്ടുമരം mal.

قثو حشينا Arab.

சுது brm.



KATU-SCHENA.

TABULA XXI.



Tertia species *Schena*; Bramannum lingua *Cajuro-Surno*, nascitur in arenosis ad altitudinem duum pedum. *Radix* duriola, ruffa, fibrosa, unicum emittens caulem, & duum ferme digitorum transversorum intervallo, inferiora versus, brevem demittens pedem, cui nova radix adnascitur, quæ, priori mortua, ad propagationem novæ remanet plantæ. *Caulis* simplex est, viridi dilutus, striatus, aqueus, in nullos cauliculos divisus, inferius, intervallo trium quatuorve transversorum digitorum albicans & extuberans, supra extuberantiam tenuior; tria ex illius summitate prodeunt *folia*, quorum duo lateralìa in duas majores lacinias, ad quas minores adhuc lacinie appendunt, divisa sunt, rotundiolis oris, in cuspidem contracta, tenuia, mollia, in utraque parte viridi diluta, linguam urentia. *Costa* media cum lateralibus viridi diluta & albicans, in adversa parte eminet, rectam striat. Floribus destituitur. *Bulbus* contritus & in decocto cum *oleo* datus fluxum sistit hæmorrhoidum; cum *lacte* acido assumptus appetitum excitat.

TABULA 21.



Katu-Schena, quasi diceret *Schena Sylvestris* à me vocatur *Arum Malabaricum minus polyphyllum*, radice *globosa*.

வெலி ^{Mal.}

Féro

तेरो ^{brum.}

وعلی ^{Arab.}



W E L I I L A.

T A B U L A X X I I.



Lanta est aquatica. *Radix* crassa, fibris densis, longis, ruffis, capillatis, in orbem vestita, hinc inde à latere fibras oblongiores, crassiores, geniculatos, ad novæ plantæ productionem, emittens, intus carne albicante, densa, succosa. *Caules* è radice exeunt plures, virides, alii in quorum vertice folium insidet, alii in vertice florem gerunt, omnes fungosi, tubulosi, molles, teneri, intus albicantes, aquei, incisi liquorem nonnihil viscosum exsudantes; illi in quibus folia videntur, ab una parte crassiores sunt, maxime ad radicem, ubi candidi sunt coloris, versus folium sensim extenuati, superius circa fastigium rotundi, paulo inferius ab una parte late ac profunde excavati, intra cavitatem, tanquam thecam, caules florigeros recipientes, qui rotundi, nonnihil plani ac tenuiores, æquali ferme crassitiei, non tam alti, membranoso, tenui, albicante & transparente involucro, quod exterius duobus limbis obsitum est, circumdati. *Folia* oblonga sunt & prægrandia, anteriora versus sensim in cuspidem contracta, à postica parte, versus quam se latius exporrigunt, utrinque in cuspidem protensa, sinu seu angulo, inter duos cuspides, ceu pedes folii, profunde excisa, in oris limbulo circumdata, densæ & subtilis texturæ, mollia, superficie valde æquali, plano, viroris in recta parte vividi, pleni, subcærulei, in adversa magis clari, saporis adurentis, sed cocta in eduliis. *Costa* cum lateralibus in adversa parte quam maxime eminet. In cacumine priorum caulium, in theca seu involucro flavo rubescente, ceu croceo, spithamam ferme longo, involutum ac reconditum est *capitulum* oblongum, crassiusculum, duriolum, globulis, seu gemmulis condensis, flavorubescens ceu croceis, in oris dentatis, obsitum;
in

in collo capituli, quod brevius est & crassius, ac theca viridi extuberante reconditum, *gemmae* planæ majores ac irregularis formæ, infra globulos flocculosos, condense ordine resident, illæ fructus sunt primordia, & cum flosculis simul proveniunt; suntque hæ *gemmae* in collo primum in totum candidæ, dein, cum magis extuberant, virides, quo colore in una parte tinguntur, vertice adhuc albicante, quædam citiores, aliæ tardiores, adeo ut gemmulis candidis hinc inde virides interpositæ conspiciantur; ubi maturuere complanatæ sunt, in medio vertice umbilico parvo notatæ, coloris ex flavo intensius rubescentis ac aurancei, molles, succulentæ, suntque tunc saporis subdulcis, & in eduliis adhibentur. *Capitulum* medium seu *stylus*, uti & fructuum *gemmae* immaturæ, saporis adurentis; gemmis hisce maturefcentibus, capitulum à collo decedit. *Semina* in singulis gemmis ceu fructibus novem, decem, plus minus recondita sunt, rotundo oblonga, cuspidata, ex albicante subruffa, parum nitentia. *Folia* trita, affata, noduloque implicita, fotum exhibent, partibus, ex nervorum compressione, stupore affectis, conducens; Rasura *fructus*, rubrarum *formicarum* ovis permixta, idem præstat. *Bulbus* radicis sanguifluæ medetur gonorrhææ.

T A B U L A 22.

Possit appellari hæc planta *Arum palustre Malabaricum*, folio *Nimphææ*, radice *arundinacea*.

Karin-pola lat.
കരിമ്പട്ടി mal.
فخاريچة arab.



K A R I N - P O L A.

T A B U L A X X I I I.



St & hæc planta aquatica, cujus *radix* oblonga, crassa, carne albicante & aquea, fibris oblongis, rotundis, albicantibus crassis instructa. *Caules* quibus folia insident, omnes ex radice exoriuntur, interius nonnihil plani, maxime circa pedem, superiori parte strictiores, *costam* foliorum constituentes, viridi fusci, dilute rubescentes, intus fungosi & aquei, viroris in recta parte saturi & nitentis, in adversa dilutioris. *Folia* oblongo rotunda sunt, in cuspidem desinentia, in oris nonnihil crispata, mollia, lenia, superficie plana & glabra, venis, ex *costa* media oblique adscendentibus, striata, illa crassa est, altum in recta parte eminens. *Flores* in propriis caulibus, qui & ex radice oriuntur, ac virides, fungosi, aquei, nonnihil plani sunt, superne collo crassiole turgentes, ac ibi rubescentes proveniunt, ampli, cochleatim quasi turbinati, cuspidem intorto, carnosus, exterius scabri, purpureo rubri, interius rugosi, rubrofanguinei. Inferius ex globulo rubescente glomulato, in fundo colli sito, exsurgit *stylus* candidus, *capitulo* flavo, oblongo, granulato nodulatus, per theculam capitatam, fungosam, rubescentem & rugis obsitam, in medio hiantem, se transmittens. *Globulus* qui, floribus deciduis, in fundo colli apparet, rubescit, spiris instructus, juxta spirarum tractum granulis eminentibus, superne planis ac rufescentibus, obductus. In hoc *semina* in numerosis includuntur cavernulis carnosus, viridibus, proxime ad corticem recondita, in singulis cavernulis unum, oblongum, primum albicans, inferius rubescens, dein in totum rubescens, transversim in globulo in longitudine situm, stylo carneo albicante circumpositum. Balneum ex hac planta præparatum omnem corporis æstum reficit.

T A B U L A 23.

Est & hæc species *Ari.*
P. XI.

M

P O N.

Pongati Lat.

පොන්ගට් Mal.

پانگاطی Arab.



P O N G A T I.

T A B U L A XXIV.



Lanta aquatica, cui *radix* valde fibrosa, albicans. *Caulis* è radice exfurgens aqueus, fungosus, viridi dilutus, novos caules à latere emittens, intus larga cavitate, corculo viridi fusco, ex quo versus corticem membranacea excurrunt intersepimenta. *Folia* pedunculis viridi dilutis interius planis, cauli appendent, oblongo angusta, in cuspidem stricta, languida, mollia, tenuia, lenia, viroris in recta parte saturi, in adversa clari, ubi numerosis eminentibus nervis, ex *costa* media, striantur, saporis ingrati. *Flores* in cacumine caulium plures congregati videntur, in capitulo oblongo, gemmæ sunt rotundæ, quæ apertæ pentapetalæ sunt & candidæ. Illis succedunt *globuli* seminales rotundi, virides, aliquo modo cuspidati, intra florum petala, ferme inclusi. *Semina* in illis arenacea, numerosa, conferta congerie, instar piscium feminis, in superficie viridis globuli, qui intersepimento medio bifidus, consita. Inferiores florum gemmæ se prius aperiunt, superiores tardius. De viribus altum est silentium.

T A B U L A 24.

Cum aliis plantis aquaticis ne minimam quidem habet convenientiam, ita ut plura de illa dicere non consultum duxerim.



Kürka Lat.

കുറു മ.

Kürka

കുറു ബ.

فوقا Arab.

K U R K A.

T A B U L A X X V.



Ascitur in arenosis. *Radix* rotunda, bulbosa, valde fibrosa, capillata, in fibris bulbis novellis instructa, intus densa, aquea. *Cauliculi* quadrangulati & viridi clari. *Folia* ex lateribus cauliculorum, geminata & ordine decussato, proveniunt in petiolis longis, planis, crassiolis, interius sulcatis, ac nonnihil lanuginosis, oblonga, rotundiola, exigue ferrata, in margine pilosa, pilis minutissimis & hirsutis obsita, crassiuscula, mollia, viridia. Ex *Costa* media costulae laterales, oblique anteriora versus, excurrunt, venulis, quae folium cancellatim pertexunt, comitatae, rectam partem striantes, in adversa eminentes. De viribus nihil constat.

T A B U L A 25.


Plantam hanc ex Ceylone consecutus sum sub nomine *Jusala*, nullos fert flores, propagatur per appendentes tuberes, perinde ac *Glans Terrestris*, atque etiam eodem modo comeduntur.

Ambel Lat.

ਐਂਬਲ ਮਲ.

ਐਂਬਲ ਅਰਬ.

कमल ब्राम.



A M B E L.

T A B U L A X X V I.



Ambel variae sunt species, *Arêca-Ambel*, *Cit-Ambel*, *Nedel-Ambel*, *Ottel-Ambel*, suntque omnes plantæ aquaticæ. Prior lingua Bramannum *Saluca* dicitur. *Radix* albicat, fibris fistulaceis albicantibus, sapore aqueis, vestita, ad propagationem novæ plantæ radicem, quam *Kelangu*, vocant, proferens, illa palmam longa evadit, crassiuscula, exterius nigricans, intus albicans, saporis aquei & subastringentis, in eduliis adhibetur. *Caules* rotundi, fistulosi, simplices, sine nodis, viridi diluti. *Folia* & *flores* in propriis proveniunt caulibus, ac illorum summitatibus insident. Illa superficei aquæ incumbunt, oblongo rotunda, rotunda anterius ora, teneriora autem, rotundo obtuso cuspide, postica parte, qua ex caule longe excurrunt, recta incisione usque ad caulem ferme discissa, in margine rotundis denticulis arcuatim excisa, in interiori superficie plana, glabra, in recta parte viroris vividi & nitentis, in adversa coloris rubri seu jecorini; in exteriori *costam* habent inter mediam, crassam, altum eminentem, ramulos transversos hinc inde emittentem, quæ se iterum in numerosa dividunt brachia, & in dentium apices ramulos immittunt, utrinque quinque. *Flores* qui aperti extra aquas emicant, veluti rosæ sunt, multipetali, petalis oblongo rotundis, angustis, anterius in cuspidem leniter contractis, coloris candidi & rosaceo diluti, in exteriori serie petala majora sunt & oblongiora, colore rosaceo, interius diluto & albicante, interius pleniori. Denso numerosorum longiorum *staminum* ornantur penicillo, quæ latiuscula, plana, flava, *stylo* medio brevi, lato, rotundo, in superiori parte latiori, plano, in orbem circumposita & versus illum inflexa, quorum illa in exteriori serie præ cæteris eminent,

ma.

magis surrecta & minus inflexa; interiora & stylo proxima, non tam longa, versus stylum magis excurvata; *stylus* superius in sua basi rosa insignitur, constans ex staminulis flavis, brevioribus, maxime inflexis, ac versus centrum contractis; exteriora folia, quæ flores in gemmis includunt, forma quoque oblonga sunt, florum petalis similia, exterius coloris viridis & venis rubescentibus in longum striata, quorum ora etiam rubent, interior pars dilutior est & albicat. *Gemmæ* rotundæ sunt & cuspidatæ. *Semina* in stylo consita sunt numerosa, intersepimentis membranaceis ac plicis a se invicem, in propriis cellulis sejuncta, parva, rotundiola, primum albicantia, sed matura ut *Nasturtii*, at fusciora.

A R E C A A M B E L.

Est & alia species *Areca Ambel* dicta, cujus florum petala paulo majora sunt, coloris minus rosacei, magis candida; etiam *stylus*, cui *stamina* flava circumposita sunt, in basi consignatus est rosa plana, conformata è costulis flavis, quæ ex nodulo medio, qui in centro basis est, ad rotundam ejus orbitam excurrunt. Prioris ut & hujus bulbosa *radix* in decocto pro *dysuria* propinatur. *Semina* ardorem ossium reficiunt, cum sacharo nempe condita & comesta; folia cum illis *Ottel-Ambel* simul trita & cum *butyro* cocta errhinum præbent pro oculorum doloribus.

T A B. 26.

Omnes hæ plantæ species sunt *Nymphae*; prior hæc appellari posset *Nymphaa Indica*, flore candido, folio in ambitu serrato.

C I T - A M B E L.

T A B U L A XXVII.



It Ambel, quasi diceret *Ambel minor*; secundum Bramannes *Casturi Camalla* cum priori convenit, estque tantum minor species, *caulibus* tenerioribus, *foliis* minoribus ut & *seminibus*. Est & alia species ejusdem nominis, in eo solum differens quod florum petala vel cærulea, vel rubra, vel alterius sint coloris. *Flores* triti in decocto pro dysuria adhibentur; cum *zaccharo* sumti vomitum sistunt, tussim mitigant; *semina* cum *zaccharo* usurpata conveniens pro diabete sunt medicatum.

T A B U L A 27.

Nymphaea hæc mihi est *Malabarica minor*, folio serrato.




Nedel ámbel Lat.

നെൽകലശൽ Mal.

نخبة فنجل عجمي Arab.

सुविपकजाती Bram.



NEDEL AMBEL.

TABULA XXVIII.



Tertia species *Ambel*, lingua Bramannum *Commodu*. *Radix*, quæ & ad propagationem minorem edit, rotundis, fistulosis, & albicantibus est vestita fibris. *Caules* è radicibus exsurgentes rotundi sunt & fistulosi, in vertice folia gerentes, quæ superficiei aquæ incumbunt, alii illorum simplices sunt, enodi, alii in supremis partibus, nonnihil infra folium quod in vertice videtur, nodulo interstinguuntur, ex quo plures transversos cauliculos emittunt, quosdam crassiores & longiores, quorum summitatibus folium, quosdam tenuiores & minus longos, quorum summitatibus flores insident. *Folia* ipsa minora sunt quam illa *Citambel*, rotundiori forma seu minus oblonga, ad petiolum rotundis oris, non vero rectis, ut *Ambel*, incisa, *costulis* minus crassis ex petiolo striata, inæquabili ora, non autem denticulis arcuatim instructa. *Flores* extra aquas aperti emicant, in totum candidi, pentapetali, petalis oblongo rotundis, cuspidatis, tenuibus, stelliformiter expansis, interiori parte ab uno latere, alio petalo, quod è medio, lacinia instar, producitur, obtecta, interius filamentis densis, candidis, longiusculis in totum obsita. *Stamina* in illis decem, parva, tenuia, *apicibus* flavis & striatis dotata, illorum quinque supra cætera eminent, & cum illis *capitulum* in medio viride, cuspidatum, *capsulam seminalem* efficiens, in summitate nodulo parvo quatuor gemmularum ornatum. *Calyx* pentafolius est, quæ parva, oblongo angusta, cuspidata, viridi clarissima. *Florum gemmæ* rotundæ sunt & cuspidatæ. Post flores capitula seu *gemmæ seminales* se produnt, illæ cuspidatæ sunt, numerosa in se continent *semina* rotunda, quæ primum albicant, sed matura colorem ut
se-

semina *Nasturtii* referunt, perinde ac illa *Ambel*. Integra planta trita & cum *butyro* cocta & intus sumta, antidotum est contra morsum serpentis *Cobra Capella* dicti.

T A B U L A 28.

Hæc *Nymphaea minoris affinis Indica*, flore albo, piloso.




Tjeroea - citámbel Lat.

കുമാരൻ മ. mal.

Cumúdí

കുമുദി brm.

جَبِيْطَاوَهْلْ arab.



TSFEROEACIT AMBEL.

TABULA XXIX.



Inor species est *Ambel*; folia & caules & radix, omni ex parte cum illis *Cit Ambel* conveniunt. *Flores* parvi sunt ac simplices, pentapetali, oblongo rotundi, stelliformes, interius in singulorum petalorum medio, foliosa lacinia secundum longitudinem alati, in orificio capillis flavis obsiti. *Stamina* in illis quinque brevia, quæ inter petalorum interstitia exsurgunt, *apicibus* surrectis ac albicantibus dotata, *staminulis* quinque brevioribus interpositis, cum quibus ex medio orificio *globulus* viridis, cuspidatus, styli instar, se prodit. *Calyx* pentafolius est, quæ folia florum petalis decussatim interponuntur. Ex *bulbo* radice in aqua, vino adusto butyroque ex cocto, linimentum præparatur antihæmorrhoidale. Ex eodem cum *cancris* terrestribus in oleo frixo ἀνδρικών conficitur medicamentum, contra molestum capitis dolorem, temporibus nempe illinitum. Ex eodem cum utroque *sandalo* & *lacte* fit potio ad corporis æstum restringendum.

T A B. 29.

Nymphaea Indica minima, flore flavo.

Tamara Lat.

കടന്നു Mal.

فانجرا Arab.

पद्मम् Bram.



T A M A R A.

T A B U L A X X X.



Res hujus plantæ sunt species, *Tamara*, *Bem Tamara*, *Culy Tamara*; prior Bramanni-
bus *Pada Mañu* dicitur, planta aquatica. *Radix* profunde demissa, crassiola, nonnihil
dura, fistulosa, fistulis latis pervia, albicans,
inferius nodosa, è nodulis tenues fibras in or-
bem emittens, subtus radices, è quibus, tanquam pri-
maria radice, novi prodeunt *Caules*; simplices hi sunt,
rotundi, fistulosi, virides, punctis aspersi. *Folia* singula
suo insident cauli, prægrandia, rotundiola, versus interiora
inflexa, crassiuscula, mollia, *Veluti* instar lenissima, in
recta parte viridi fusca, ast oblique aspecta hiali, ceu ex
viridi cærulei coloris, in adversa viridi diluta. *Costæ* quæ
viridi claræ & nitentes, ex caulis summitate, veluti radii
è centro, exeunt, quæ postquam ad certa intervalla, sin-
gulæ in duos ramos bis terve sunt divaricatæ, proxime ad
oras in se invicem arcuatim & formicatum deferuntur; in-
ter has, in adversa parte tantum eminentes, venæ trans-
versæ mutuo inoculatæ conspiciuntur. *Flores* qui cauli-
bus propriis insident, prægrandes sunt, petalis constantes
confertis, coloris rosacei albicantis, odoris grati *Anysum*
spirantis; *petala* ipsa, oblongorotunda sunt, rotundis
oris in cuspidem contracta, venulis, ex unguiculis, in
longum striata, coloris rosacei, in superiori parte magis
saturi; exteriora majora sunt ac latiora interioribus; hæc
in duos, tres, pluresve inciduntur cuspides, & *staminulis*
ornantur flavis, quæ cum *apicibus* ceu nodulis candidis,
ex angulis incisionis emicant. In medio florum densus est
penicillus longorum, planorum, croceorum *staminum*,
in summitate oblongis & candidis nodulis ornatorum, in-
teriori parte futura candida, ex qua nodulus, itidem can-
didus, producitur, striatorum; ille circumpositus est *stilo*
ro-

rotundo, luteo, in summitate plana & lata superficie, inferiora versus contractior, intus fungosus, ad basim superiorem in suis cavernulis seu cellulis *semina* recondens, quæ oculis ex flavo nitentibus, gemmularum instar plano rotundarum, extra illam emicant; ipsa semina primo sunt albicantia, subflava, formæ cylindricæ, deinde ad ellipticam formam accedentia, & cellulas suas dilatantia, magis magisque ex basi superiori styli extuberantia, nigra, furda. *Radix* trita & saccharo mixta in formam conditi exhibetur pro hæmorrhoidibus. *Succus* è floribus extractus, & cum Oleo *Zirgelim* assumptus, inmodicum mensium sistit fluxum.

T A B U L A 30.


Tamera hæc à nemine unquam est descripta. Mihi erit *Nymphaa affinis Malabarica*, flore amplo, rosaceo albicante colore.



Dem-támara Lat.

മെന്താമര Mal.

مِنْطَا مَرَّه Arab.



B E M T A M A R A.

T A B U L A X X X I.



PLanta itidem aquatica, in eo tantum à *Tamara* differens, quod *flores* sint paulo ampliores, illorum petala candida, odoris nonnihil vegetioris. Post accurationem observationem sequentia addenda duximus; scilicet quod folia *Tamara* & *Bem Tamara* duorum in diametro sint pedum; caules fistulosi, proxime ad radicem aquei, in partibus superioribus intus lactei, filamenta ex illis albicantia, tenuissima, numerosa, velut araneorum telæ, ex lacteo isto succo nendo educantur & in longum protrahantur, satis firmæ. Ex caulibus foliosis tantum quatuor, tubulis majoribus, pervii sint, numerosis minoribus tubulis ad latera instructi; Caules hi proxime ad umbilicum ceu centrum decisi; costæ singulæ, quæ ex umbilico viginti & una numerantur, & tubulis caulium lateralibus respondent, tubulacea cavitate pervii sunt; sed in medio umbilici dissecti, caules nempe, crux carnosæ apparet, cujus una pars superior versus partem folii contractior est. Præterea septem caules floriferos, etiam latis tubulis esse pervios, & in illorum medio *stylum*, ex quo tubulorum intersepimenta exsurgunt, atque & ille unico tubulo in medio pervius est. *Bulbus* cum *butyro* in unguentum redactus omnia oculorum vitia corrigit; Idem cum *Zingibere* & *Coriandro* in *butyro* contritus, pro hæmorrhoidibus applicatur.

T A B U L A 31.

A me vocatur *Nymphaeæ* affinis *Malabarica*, folio & flore amplo, colore candido.

Kooda-pail Lat.

കൂട്ടപ്പൈൽ mal.

Zelo

सेकरो bram.

فخا فخا يغيل Arab.



KODDAPAIL.

TABULA XXXII.



Lantula aquatilis & natatilis, transversis, aqueis & albicantibus repens caulibus, qui oblongas, albicantes, capillatas, in densa fascia, emittunt fibras. *Folia* plura congregata ad radicularum fascias exsurgunt, oblonga, ad latera rectis oris, in vertice ora rotunda, crispata, una cum caulibus admodum fragilia; viroris hiali, inferius albicantia, anterius, nervulis oblongis ramosis striata, exterius plicis eminentibus in longum crispata, tenuiter villosa, inferius ad radicem pilosa lanugine vestita, carnosa, crassiola, tubulis parvis, rotundis, intus pertexta. *Flores*, odoris expertes, ex mediis prodeunt foliis, quorum petala tenera, crispata; unum illorum oblongum est & albicans, interius cochlæato cavum, anterius strictius, in medio superioris partis fissum, utrinque in oris ad latus plica annulari, interius eminente crispatum, ex cuius medio, supra plicaturam, parvus & erectus exsurgit *stilulus*, qui superne in orbem, sex albicantibus est dotatus *gemma*, ad exortum viridiusculo foliolo rotundo, quod inferius duabus laciniis veluti auriculis, est instructum, quasi collari succinctus. *Collum* florum oblongum est, pilis oblongis albicantibus capillatum; ex ejus orificio *gemma* emicat cuspidata, albicans, viridi diluta, *nodulo* aqueo albicante dotata, in qua semina visuntur. *Gemmae* seminales oblongorotundæ evadunt, in cortice, vitri instar pellucidæ, petiolis transversim insidentes; uno latere, quo cælo obversæ, marcescenti, florum petalo transversim adhærentes, intus aqueo humore repletæ. *Semina* in illis sex oblonga, viridiuscula, cortici *gemmae*, circa illam partem, qua petalo adhærent, interius insidentia. *Folia* cum *Oryza* in lacteo *Nucis Indicæ* succo lævigata medicamentum præstant antidysenterici-

tericum. Cum aqua rosacea & saccharo data, tussim graviolem & purulenta phlegmata corrigunt, hæmopsiam inhibent. Radix cum cumino in lacte vaccino trita & epota alvum promovet, tenesnum lenit, lumborum & hypogastrii dolores emollit. Idem præstat si cum Calamo Aromatico & aqua calida assumatur.

T A B U L A 32.

Planta hæc aquæ innatat perinde ac *Stratiotes* | milari possit. Vocari posset *Sedum Indicum palustre*,
 seu *Aloës Palustr.* Bauh. in *Pinac.* à nemine unquam | *foliis latissimis, crispis, floribus albicantibus pi-*
 est descripta neque conspiciem habet cui assimi- | *losis.*




Panovér-tjeraúá Lat.

പഞ്ചവർഗ്ഗം Mal.

Zelo

ഇംഗ്ലീ. Gram.

بَعْنَا وَفَرْجَرَاوُغْ Arab.



P A N O V E R T S J E R A U A.

T A B U L A XXXIII.



Lanta est aquatica. *Caulis* geniculati, super fundum repentes, aquei, viridi albicantes, ex geniculis radículas seu fibras duas pluresve emittentes, filamentis viridibus condensè vestitas. *Folia* in caulibus petiolis oblongis, aqueo albicantibus, superius ventre plano turgescuntibus ac pilosis, proveniunt lata, cuspidata, ad oras acutis, profundis crenis incisa, posteriori parte ad petiolum recta & æquali ora, crassa, spissa, in interiori superficie valde plana, admodum glabra, in exteriori *costis* crassis, viridi albicantibus, ramosis, è *Costa* media exeuntibus, & in venarum cuspides incurrentibus obsita, coloris sanguinei, nullius saporis. Vetustior facta planta, ex vertice caulium in communi pede, folia numerosa ac ampliora, dense in unam quasi fasciam, rosæ referentes formam, congregata proveniunt, pluribus radicibus infra dictam fasciam interius dimissis. Extra usum in Medicina est.

T A B. 33.

Cum non plenarie hæc planta sit descripta; de flore enim & seminibus nulla mentio, nihil certi hic apponi poterat, nisi quod pro *Hedera palustri* possit haberi.

Shrymium capitatum (Santalum ovata L.)

Pars II. Tab. 34.

Nazú Kilá lat.
നാടു കിലാ mal.
Polo
पोलो brah.
نَعْرُو قَبِيلَ arab.



NARUKILA.

TABULA XXXIV.



PLanta nascens in aquosis. *Radix* nigricans, fibris vestita. *Caules* rotundi; aliquantulum complanati, glabri, virides, interiori superficie cavi, intra cavitatem teneres excipientes caules, superiori parte unico nodulo interstincti, fungosa intus, albicante, aquea medulla. *Folia* verticibus caulium insident, in singulis, unum, ampla, oblongo rotunda, cuspidata, venis subtilissimis paralellis, ex *costa* media, quæ in recta parte eminent, ad oras striata, viroris saturi & nitentis, in adversa, diluti, surdi, foliis *Kattu bala* quam maxime similia sunt, sed minora. *Flores* in caulibus propriis suis petiolis proveniunt, in illorum vertice quasi fascia insidentes, ex hiato aperto caulis, qui circa geniculum videtur superiorem, & intra quem prius inclusi fuerant, tanquam vaginam seu theculam infra folia emittentes, prodeuntes ex calycibus oblongis, grandiusculis, viridibus ac rubescentibus. Ignoti usus.

TABULA 34.

Et hæc descriptio imperfecta est, ita ut ex illa nihil concludi possit, atque ideo lubens accuratius iudicium aliis relinquo; ego dicerem. *Canna* seu *Arundinis Indica* affinis, flore globoso.

Bela-pola Lat.
വെളുത്തു മാ. Mal.
Te' Te' Arab.



B E L A P O L A.

T A B U L A X X X V.



PLanta itidem aquatica. *Radix* bulbosa, (bulbi rotundi sunt, primum albicantes, ex inde virides, intus carnosi, carne succulenta & nonnihil viscida, albicante, viridi, ipsi bulbi se mutuo propagantes, ita ut tres quatuorve simul juncti conspiciantur) fibras oblongas, crassiusculas, plurimis filamentis tenuioribus vestitas, primum albicantes, dein rufescentes emittens. *Caules* ex radice exsurgentes rotundi, simplices, foliis vestiti, interius albicantes, succulenti & viscida. *Folia* quæ caules investiunt, ac supra se mutuo pedibus cavis circumvoluta, oblongo angusta sunt, in cuspidem stricta, cubitum longa, quatuor transversos digitos, sed in medio plures, lata, venis subtilioribus in longum striata, lateribus versus inferiora parum clausis, viroris in utraque parte saturi. *Costa* in adversa parte eminet crassiola, viridi albicans, à latere duæ tresve minores conspiciuntur, rectam partem quasi sulcis striantes, odore gravi, sapore nonnihil porraceo; exteriora folia quæ caulem circa radicem investiunt, minora sunt & albicant. *Flores* in summitate caulium fasciati proveniunt, pedunculis viridibus, nitentibus, surrectis, striatis crassis, in superiori parte magis exturgescuntibus, ac leviter incurvatis, oblongo, angusto, viridi folio, inferius succinctis; hexta petali sunt, illorum quinque oblongo angusta, uniformia, in totum candida; sed tria exteriora magis angusta, exterius nitentia, minus candida; sextum latius est & cochleato cavum, oblongum, ad ventrem petioli situm, folio exteriori medio, quod ex dorso prodit, oppositum, exterius in totum candidum, anteriori ora albicans, infra oram in medio, duabus oblongis, latis, flaviusculis striis signatum, ad strias rosaceo rubescens, inferius ex medio venis, tenuiter rubescentibus, oblique versus oram striatum. Ex inferiori orificio *lingula* exsurgit, oblique surrecta,

recta, candida, crassiola, aliquantulum cuspidata, cujus plana pars, petalo cochleato cavo est obversa, infra cuspidem *gemma* crassa, flaviuscula dotata. *Flores* in totum male olent, saponis odorem æmulantes. *Gemmæ* florum virides, dein albescentes, ad partem petali cochleato cavi alte exturgentes. *Fructus* oblongi, trigoni, in medio laterum crassa ac altum eminente costa obducti, cortice crasso, aqueo, viridi saturo, nitente, saporis fabacei, sylvestris ac visceris, in medio farinaceo, ruffo pulvere repleti; animadvertendum porro quod florum petala ipsa germina ac primordia sint fructuum; qui illis *Marabára* admodum similes sunt. *Bulbus* cum aqua *Oryzæ* in linimentum præparatur adversus phlegmonodes, tumores & abscessus.

T A B U L A 35.

Mihi hæc planta est *Gladiolus Indicus palustris latifolius*, flore albicante.



Elapola Lat.

உலகெருகு Mal.

اليلج Arab.



ELAPOLLA.

TABULA XXXVI.



Ascitur in arenosis. *Radix* bulbosa, inferiorius fibris candidis vestita, intus carne densa, humida, viscida, durioribus carnosissimis fibris pertexta, odore gravi. *Folia* plura ex radice pedibus oblongis, rotundis, theciformibus, in quibus alia teneriora includuntur, exsurgunt oblonga, in cuspidem stricta, nitentia, intus venis subtilibus in longum striata, in adversa parte quinque *costulis* lignosis eminentibus instructa, quarum media crassior, omnes glabræ sunt, rectam partem striantes, odoris gravis. *Flores* in caulibus proveniunt simplicibus rotundis, glabris, viridibus, geniculatis, è radice exsurgentibus petiolis, foliis oblongoangustis, cuspidatis, circa geniculos vestitis, intus carnosissimis, fibris densis, lignosis, intra carnem humidam pertextis; flores ipsi superiori parte caulium illic loci ubi minus lignosi, insident, ad exortum foliolo parvo, oblongo angusto, cuspidato, viridi, inferius succincti, oblongi, cyathi seu campaniformes, exterius tribus eminentibus futuris in longitudine perducti; interioribus ab orificio ad medium usque cærulescentes, exterius albicantes. *Stylus* in medio eminet nigricans, extra orificium *nodulo* flavo dotatus. *Fructus* qui cacumini caulium omni ex parte insident, oblongi, triangulati, quorum latera, plana, supra & infra strictiores, viridi fusci, glabri, in medio laterum futura crassa, rotunda, viridi, alte extuberante obducti, in vertice *umbilico* eminente ruffo instructi; membrana qua ruducuntur carnosissima est & crassa, interiori parte viridi flava; nullis seminibus, sed intus *glomulis* lanuginosis, albicantibus, qui deinde ruffescunt, maxime ad angulos repleti; etiam florum petala in fructus excrescunt. Ex foliis, radice & virente *Curcuma* linimentum præparatur temporibus pro Cephalæa applicandum.

TABULA 36.

Specialis hæc planta est, externa facies cum *Gladiolo* conferri posset, sed flos aliquam cum illo *Digitalis* videtur habere convenientem; ego dicerem *Gladioli affinis latifolia*, flore campanulato.

BELAM CANDA SCHULARMANI.

T A B U L A XXXVII.



Ramannes dicunt *Arty*, planta est ad altitudinem hominis assurgens, arenoso gaudens solo. *Radix* glandulosa, crassa, albicans, intus densa, subflava, subamara, longas albicantes & tenuiter capillatas ejiciens fibras, tres quatuorve oculos ex se promens. *Caulis* è radice assurgit unicus, pollicem crassus, nodulatus, intus albicans & fungosus, foliis ad nodulos circumvestitus. *Folia* oblongoangusta, tres pedes longa, pollicem, aliquando duos, lata, acinacea, venis in longum striata, ex una parte oræ, quæ inferius est profundior, hiantia, caulem excipientia, & labris arctissime circumplectentia, viridis exterius communis & nitentis, interiori parte, ubi hiant, membrana albicante obducta. *Flores* in fastigio ipsius caulis, vel cauliculorum transversorum, qui ex caulis nodis hinc inde exsurgunt, petiolis teneris, viridiflavescens, pandis, ex uno eodemque nodulo plures, quatuor, quinque congregatim erumpunt, hextapetali, oblongo rotundi, ad petiolum stricti, anteriora versus, rotunda ora in cuspidem contracti, inter flavum colorem notis intense rubris interius variegati; tria petala, quæ breviora & minus lata, tota superficie interius sunt variegata; reliqua tria, quæ paulo longiora & latiora, & prioribus singulis interposita, ex unguiculis ad medium usque variegantur, antè colore rubro dilutiori; in adversa parte petala flavescent ad oras tantum rubris notis transparentibus, ac *costa* eminente in medio striata, nullius odoris. *Stamina* in illis rubicunda & surrecta conspiciuntur tria, *lingulis* flavis, surrectis dotata; *stylus* crassior est, rotundus, triangulatus; calyce destituuntur. *Petioli*, proxime ad flores, crassiores sunt & extuberantes, tribus lateribus planis, in medio striatis, circumscripti, *seminum capsulas* efficientes, quæ floribus deciduis ampliantur, &

ex viridi subflavo viridiores evadunt, & in tria seminalia loculamenta mediis distinguuntur intersepimentis. Planta integra cocta & pro lotione corporis adhibita antidotum est contra omne venenum. *Radix* trita & applicata mor sui serpentis Cobra Capella dicti, medetur. *Folia* cum *Oleo Schirgelim* ab indigenis adhibetur, ad vaccas & jumenta, eduliis venenosis infecta, vel animalibus venenatis læsa, tum intus, tum foras, sumpta & applicata, curanda.

T A B U L A 37.

Flores hujus plantæ cum sint variegati perinde ut *Flos Tigris Dodon.* alterius autem structuræ, sed quoad formam externam aliquo modo convenientes, & à nemine autem quod sciam ante hæc sit descripta planta, meo judicio vocari posset. *Gladioli affinis Malabarica, flore flavo, maculis rubris intersperso.*




Béam-cánda-schulármani Lat.

വെള. കണ്ടു ചുറ്റു മരം Mal.

بحمّشام فحارطاء جبور Arab.

مانی

आम्रि gram.



Bellutta-pola-taly Lat.

മലയുഷ്കദളി mal

بجلا طقالي Arab.



BELUTTA POLA TALY.

T A B U L A XXXVIII.



Quatica est planta quæ circa fluviorum ripas invenitur. *Radix* crassiola, bulbosa, carnosâ, aquea, ex tunicis quasi super se injectis formata, corculo flavo, fibras crassiores oblongas ex inferiori parte emittens, illæ primum albicant, dein flavescent, saporis aquei. *Folia* ex radice prodeunt, oblonga, gladiolorum instar, in cuspidem desinentia, inferiori parte mutuo theciformiter convoluta, interiori parte clausa, crassiuscula, fungosa, venis in longum striata, viridifusca, ad radicem albicantia. *Caulis* è radice exsurgens plano rotundus, viridi dilutus, ad radicem candens, fungosus & aqueus, in cortice, si à carne deglubatur, interius instar holoserici. *Flores*, odoris expertes, octo vel decem simul ex collo oblongo, viridi diluto, quo, exteriora versus, nonnihil reflectuntur, in fastigio caulium proveniunt, inferius ad exortum crasso pede extuberantes; illorum sex vel octo ordine exteriores sunt, duo interiores confiti, filamentis candidis inferius interspersi, liliacei, pentapetali, angusti, cuspidati, candissimi, in medio & exterius tenuiter extuberantes, venis in longum striati, exteriora versus in totum reflexi. *Stamina* in illis quinque, oblongo rotunda, *apicibus* oblongis, nutantibus, transversis, croceo rore adspersis, sub rore nigricantibus dotata, de cætero rubropurpurea, nitentia, inferiori parte candida, superiori colli orificio, ad petalorum unguiculos inserta. *Stylus* surrectus, oblongus, rubro purpureus & nitens, è medio florum emicat, inferius candidus, ex pede colli. *Florum gemmæ* oblongæ, strictæ, conicæ, primum ex flavo albicantes, dein magis albescentes, exterius in medio, ubi extuberant, nonnihil rubescentes. Porro notandum quod flores, simul congregati primum folioso involucro, quod

quod in duo se findit cuspidata folia, sint inclusi, constituentibus capitulum oblongum, crassiusculum; sed rupto involucro, prodeunt, duobus foliis, quæ exterius viridia, interius candida, ad planum caulium latus inferius succincti. *Fructus* illis *Pola Tali* similes sunt, eodemque modo ex pede colli florum excrescunt; *semina* continent candida, carnosæ, succulenta. Ex planta concisa & tosta bini fiunt noduli, qui utrique maxillæ appositi, spasmodum curant Cynicum.

T A B. 38.

Hæc *Lilio Narcissus* conspecies est *Tolabo Ceylanensis*, seu *Lilii Ceylanici umbelliferi & bulbiferi*. | ipsissima, hoc solum excepto discrimine, radicem hujus paulo minorem esse delineatam, quam quidem reipsa sit.




Soranna-póla-táli Lat.

വെളുത്തുനീർ *Mal.*

يُخْلَا طُعْلِي *Arab.*

काळकादो *Hind.*



S F O V A N N A P O L A T A L I.

T A B U L A X X X I X.



Pecies est *Tali*, Bramannes dicunt *Gola Kondo*, planta trium pedum altitudine, arenosa amans loca, etiam ripas aquarum. *Radix* bulbosa est & albicans, subtus plurimas, albas, fungosas, humidam emittens fibras, saporis aquei & subamari. *Folia* gladiolorum, seu foliorum *Lilii* instar, ex se invicem prodeunt, ad radicem combinata, lata, crassa, in marginem acutam extenuata, minutis ac raris cuspidibus in oris minuta, venis in longum striata, plurimis magnis fistulis seu tubulis (quæ simplici ordine ac serie ad se invicem sunt confitæ, ac mediis membranaceis parietibus ordinate interclusæ;) intus in longitudine pervia. E medio foliorum *caulis* viridis, planus, compressus, intus albicans, fungosus, fistulosus, ex radice exsurgit, in cuius summitate *flores* plures simul, quinque vel sex congregatim, singuli propriis, rotundiolis, viridiflavis petiolis, qui ex nodulo superiori caulis erumpunt, proveniunt, monopetali, oblongo angusti, cuspidati, candidi, quatuor aut quinque ferme pollices longi, unum lati, in longum striati, oris nonnihil interiora versus, clausi, odoris debilis sed grati. *Stamina* in illis sex, longiuscula, maxima parte petalis inserta, purpureo rubra, nitentia, inferiora versus albicantia, *apicibus* grandiusculis, lunulatis, nutantibus, flavo rore conspersis, dotata; *stylus* cum hisce conspicitur tenuis, in totum purpureo ruber, qui per petiolum transmittitur, & ibi ex parte albicat. Deciduis floribus majorem petioli contrahunt virorem, & inferiori parte, quæ circa nodulum est & crassior, in *capsulas seminales* extuberant & turgescunt, adeo ut plures seminales capsulæ congregatim nodulo caulis insideant; suntque hæ, ad petioli figuram, primum oblongo rotundæ, crassitie tantum à reliqua petioli parte differentes, deinde, cum ad justam pervenerint magnitu-

dinem, caule superiori deciduo, rotundæ vel rotundo-planæ, cortice viridi diluto flavescente, venulisque in longum striato, cujus caro intus albicat & fungosa est, tenuiter obductæ. *Semina* pro ratione magnitudinis in illis, tria, quinque, septem continentur, totam capacitatem sub cortice replentia, filamentis quibusdam fungosis, albicantibus, hincinde, tenuiter intersepta, variæ figuræ; uno latere, quæ cortici proximum, rotundo, aliis planis, coloris albicantis & subviridis; illorum caro albicat & aquea est, etiam sapor aqueus est. Semel quotannis floret, tempore nempe pluvioso. *Radix* bulbosa trita & tosta hæmorrhoidibus apponitur, conducitque apostematibus aperiendis & maturandis; eadem tosta & cani data, dentes illius excidere facit: *folia* tosta *carbunculis* applicata, dolorem ex illis obortum mitigant, ungues excarnificatos sanant.

T A B. 39.

Inter omnes *Lilio Narcissos* hæc omnium maxima est, à nemine, quod sciam, antehac unquam descripta.



Catulli-pola Lat.

കാട്ടു കോൽ mal.

قحط و الحربي Arab.

कोळकादो bram.



CATULLI POLA.

TABULA XL.



Lanta sesquipedis altitudine, nascens in arenosis. *Radix* bulbosa est & candida subtus tenues & albicantes ejiciens fibras. *Folia* quæ ex radice oriuntur instar *Lilii* sunt seu gladioli oblongi, in cuspidem desinentia, venulis in longum striata, in medio crasso tergo extuberantia, parum interius clausa. Inter folia, ex radice, unicus exsurgit *caulis* compressus, viridis, spithamam longus, in apice nodulatus. *Flores* propriis cauliculis, in summitate caulis, plures congregati videntur, septem vel octo, ex uno eodemque caulis nodulo simul exsurgentes; in totum candidi sunt, odore debili sed grato, optime conformati, duplici petalorum ordine constantes; in exteriori sex petala sunt oblonga, angusta, surrecta, in cuspidem desinentia, venulis in longum striata, *costula*, in adversa parte parum eminente, instructa, stellam diceres sexcuspidalem; in interiori ordine stella est versus umbilicum campaniformis, duodecim in oris cuspidibus eminens, cui folia exteriora cum ima parte adstringuntur. *Stamina* in illis sex candida, campaniformem ex umbilico stellam interius striantia; singulaque in intermedios cuspidum angulos eo ordine incurrunt, ut duos inter se relinquant cuspides, sed superiori parte ex angulis eminent, flavis & incumbenibus *apicibus* ornata. *Florum gemmæ* oblongo rotundæ, ex viridi magis magisque albescentes, striis numero sex, quæ in vertice cœunt, striatæ. *Fructus* eodem modo ut illi *Pola Tali* proveniunt. Etiam *semina* albicant, quorum caro albicat & aquea est, sapor etiam aqueus. Semel quotannis floret, tempore nempe pluvioso. *Radix* in sole exsiccata & in pulverem redacta cum *saccharo* nigro exhibetur pro hæmorrhoidibus; ejus decoctum ex aqua idem præstat, pro lotionem nempe adhibita. Tosta & deintrita apostematibus aperiendis & maturandis super imponitur; addito *oleo* podagræ cum illo perunguntur: *folia* unguibus circumdata, illorum dolores sedant.

TABULA 40.

Narcissus est *Ceylanicus*, flore albo hexagono odorato Hermannii in *Catalog. Hort. Academ. Lugd. Batav.*


Katsjula - kelengú lat.

കച്ചുലക്കുളം mal.

Capúra - catari

कापूरकटी bram.

فخاجيولا فخانغيا amb.



KATSJULA KELENGU.

TABULA XLI.



Ramannes dicunt *Capura Catari* planta nascens in arenosis. *Radix* carnosæ, albicans, fibras emittens, & novellis se propagans oculis, odoris fragrantis & aromatici, maxime cum sicca, *Zinziberis* instar, albicante sicca carne, cortice ruflo, rugoso. Duo ex radice *folia*, pedunculis surrectis, latis & cavis exsurgunt, in transversum extensa, ex adverso sita, ampla, rotundiola, inferius sinulo cavo, angusto excisa, crassa, carnosæ, glabra, venis subtilibus annularibus, quæ folium intus obscuro tractu subeunt, ex media *vena* striata, viroris in superiori parte saturi & fusci, in inferiori, quæ radici obversa, viridi clari, in oris limbulo rubescente instructa, odoris grati aromatici. *Flores* ex radice inter folia media surrecti exsurgunt, oblongo petiolo ceu collo, tripetali, duo illorum oblongo rotunda & candida, tam interius quam exterius: tertium hisce oppositum, anterius in medio, in duo alia quasi petala est divisum, interius candidum, in medio & ima parte ad pedem purpureo rubrum, exterius candidum, in pede interiore dilute flavescent & viridescens, suntque in totum tribus oblongoangustis candidis foliolis seu auriculis succincti. Ex florum medio *stylus* exsurgit latus, foliaceus, candidus, ad pedem petali purpurei flavescentem accumbens, superne in duas ungulas fissus, quæ à petalo purpureo sunt reflexæ. In medio flavus est, intus angusta theciformi cavitare, per quam alius, se transmittit *stylus* candidus, tenuissimus, *gemmula* nodulatus: flores in totum illis *Tsjengeli-nel-Kelengu* non dissimiles sunt. In super observavimus, quod loco floris emarcidi ac decidui, una nocte flos novellus cum petiolo ferme pollicari è radice exsiliat, ocyus ergo nascuntur. *Radix* siccata in transversas inciditur lamellas, & dividitur. *Bulbus* cum recenti *butyro* in pillulas redactus, asthmaticis datur.

TABULA 41.

Parem non habet hæc planta; mihi est: *Planta bifoliata, radice tuberosa, flore tripetalo difforni Malabariensis.*

Katú - Kapél Lat.

കാട്ടുകപ്പൽ Mal.

فخاطو فخابهل Arab.



KATU KAPEL seu CADENACO.

T A B U L A XLII.



NAscitur in arenosis. *Radix* fibrosa, carne intus albicante, filamentis lignosis pertexta, cortice ruffo, saporis aquei. *Folia* ex radice oblonga ad duos exsurgunt cubitos, inferius foliis minoribus investita, exterius convexa, interius cava, viridia, rigida, venis lanuginosis in longum striata, valde crassa & carnosae, carne intus densa, albicante, aquea. *Flores* in propriis proveniunt caulibus, qui ex radice oriuntur rotundis ac petalis investuntur oblongis, tenuibus, extus aqueo rubescentibus, intus aqueo viridibus, illorum superiori parte undique infidentes, bini vel terni simul in uno communi pedunculo, hexapetali, oblongo rotundi, angusti, nitentes, in medio vena striati, collum oblongiusculum est & candidum. *Stamina* in illis sex, oblonga, candida, oblongis, flavis, nutantibus apicibus dotata. *Stylus* etiam oblongus est & candidus, ex globulo prodiens albicante, inferius in collo sito. *Fructus* rotundi sunt, simplices, vel etiam bini juncti, viridi diluti, quorum duo latera globosa; in quibus unum aut duo reconduntur *semina*, quæ tenera, saporis fabacei. *Folia* trita & in formam boli redacta, adversus ophtalmiam & oculorum suffusionem assumuntur: cum radice addito *Allio* ac *Auripigmento* in oleo *Sergelim* decocta, gonorrhæam sanant, si nempe caput cum oleo illo illinatur; *Bulbus* cum *sandalo* citrino & *butyro* bubulino tritus linimentum exhibet, in nervorum contractionibus & ardoribus adhibendum. Tota denique planta oleo butyroque incocta omnium oculorum vitia emendat.

T A B. 42.

Appellari posset hæc planta, *Asphodeli Indica affinis*, floribus hexapetalis, spicatis.

Kátú-báa Lat.

കാട്ടുവണ്ടി Mal.

Ranakéri

गानकेकी Bram.

فخاطو وعضا Arab.



K A T U B A L A.

T A B U L A X L I I I.




Ramannes dicunt *Rana Queri*, planta est ad altitudinem staturæ exsurgens humanæ, arenoso & udo gaudens solo. *Radix* oblonga, rotunda, corticibus investita, pilis in orbem circumdata, oculata, ex quibus denuo propagatur. *Caulis* simplici pede ex radice exoriens, rotundus est, viridis, geniculatus, ad geniculos foliis arcte vestitus & obvelatus, ex inferioribus geniculis ad radicem, supra foliorum exortum, novos caules emittens. *Folia* quibus caules investiuntur, tenera adhuc, in totum in se invicem sunt convoluta, oblongo rotunda, lata, mollia, plana, lenia, glabra, venis paralellis ex *costa* media crassiori, quæ in adversa parte altum eminet, striata, in totum foliis *Bala* vel *Figueira* similia, qua de causa à Lusitanis *Figueira de Mato* vocatur; viridis in recta parte fuscioris & nitentis, in adversa dilutioris, ex se invicem prodeuntia, ac parte superiori, qua caulem deferunt, patente orificio convoluta, quæ in summitate sunt caulem arctius amplectuntur & nonnihil rubescunt. *Flores* simul proveniunt cum *fructibus* in cacumine caulium, ubi in tres acutos stringuntur angulos, fusce rubescentes, vertici fructus insidentes, illi viridi dilutis, semiuncialibus, angulatis & duriolis petiolis, ex caulium angulis, bini & bini, alternato ordine erumpunt, ac singuli folio follicoso, quo primum cum suo flore obteguntur, ad exortum petiolorum succinguntur. Ipsi flores octopetali sunt, oblongi, diffformes, coloris coccini vel venuste miniati, inferius ad unguiculos flavi, petalorum unum

maius, oblongius, latius ac lenissimum est, instar *Veluti*; duo latiuscula sunt; unum notis rubris in flavo colore variegatum; unum in ora oblongo, ruffo eminens apice seu staminula; omnia constricta sunt & non expansa, & hoc, ob arctum calycis orificium quo excipiuntur. *Calyx* è tribus constat foliis oblongis, cuspidatis, rigidiusculis, constrictis, surrectis, quæ rubro fusciora sunt & magis nitentia, intus venulis, versus cuspidem, striata. In florum medio *Stylus* videtur planus, latus, subflavus, nitens, superiori parte parum rubicundus. *Gemmæ* florum oblongo rotundæ, in cuspidem desinentes. *Calyx*, quo flores includuntur, rubro fuscus. *Fructus* ipsi capitula sunt oblongorotundiola, futuris interstincta, gemmulis spiculiformibus, rigidiusculis, transparentibus, undequaque bullatim exasperata, in totum viridia, in cuspidibus gemmarum rubescentia, cum sicca sunt nigricantia; spiculo, ubi flores decidere minuta. *Semina* intra singula fructuum latera, in totidem distinctis capsulis, sita sunt, quæ interius membrana à se mutuo interstinguuntur, in singulis capsulis tria vel quatuor, nullis unguiculis adhærentia, sed crassiola albicante lanugine involuta, formâ exacte rotunda, *pisi* magnitudinis, primum albicantia, deinde rufa seu subrubra, punctis nigricantibus interspersa, saporis parum adstringentis. E *fructibus* parum tostis succus elicitur, qui auribus immixtus dolores illarum mitigat. Ex iisdem & *saccharo* massa componitur, & umbilicali regioni applicatur contra *diabetem*, ex calidis febribus ortam. *Succus radicis* Mercurii sublimati toxicum infringit.

T A B. 43.

Parte prima hujus operis descripta est *Musa Serapionis* sub nomine *Bala*, & hoc, meo judicio, quia istius folia, cum hujus aliquam habent similitudinem. Hæc *Katu Bala* vocatur, quasi diceret *Bala Sylvestris*, & est *Arundo Indica latifolia*, *Bauh. in Pinac.* communi nomine *Canna Indica* dicta, vel *Longas Stapel. in Theophrast.* Diversæ hujus species in hortis Hollandiæ excoluntur, ut sunt.

Arundo Indica latissimo folio, flore rutilo. Cat. Hort. Reg. Paris.
Arundo Indica latifolia. Bauh. Pin.
Arundo Indica Americana, flore fulgente, cocco, splendente. Cat. Hort. Med. Amstelod.
Arundo Indica latifolia, flore luteo, punctato. Bauh. Pin.
Arundo Indica angustifolia, flore flavo. Cat. Hort. Med. Amst.
Albata. Pison.



Carim-gola lat.
കരിങ്കുളു mal.

كحارينغولاء arab.
കിളോതപൽ him.



1744

CARIMGOLA.

TABULA XLIV.

*Ponte d'Am. vaguado
Pas. syn. 1.348.*



PLanta est aquatica ad altitudinem exsurgens cubiti. *Radices* fistulosæ, albicantes & rubescentes, fibris vestitæ, illæ primum albæ, dein crocæ, pluribus capillis flavis in circum quasi implexæ. *Caules* plures uniti & combinati exsurgunt, rotundi, circa interiorē partē nonnihil plani, fungosi, valde fistulosi, hinc inde in folliculos, à quibus novi prodeunt caules, extenuati. *Folia* quæ singula, unum numero, in summitate caulium proveniunt, forma sunt cordis oblongi, inferius latiora & superiora versus, oris parum rotundis, in cuspidem acutum desinentia, superficie lenia, textura condensâ, crassa, mollia, venulis densis, quæ omnes in petiolo excurrunt & in cuspidem intrant, striata, *nervulo* in adversa parte parum eminente instructa, viroris in una parte fusci, in alia communis, saporis subastringentis. *Flores* ex caulium superiori folliculo, infra folia, cum cauliculo fistuloso erumpunt, cauliculi petiolis congregatim infidentes, nullius plane odoris; hexapetali sunt, petala ipsa oblongo rotunda, surrecta, tenuia, membranacea, coloris in totum cærulei, corusci & scintillantis, papilionum alarum instar, maxime si in sole conspiciantur; in parte exteriori *costa* viridi per medium striantur: tria ex illis latiora sunt, tria angustiora, inter singula latiora interposita. Sex in illis videntur *stamina* cærulea, *apicibus* surrectis, striatis, ac flavis, dotata; illorum unum cæruleo pallidius & latius est, *lingulam* habens cæruleo viridem, quæ cæteris est longior, latior ac eminentior, sub lingula laciniam folioli instar angusti. Inter illa è *globulo* viridi vel subflavo, qui in orificio florum hæret, prodit *stylus* cæruleo albicans, staminibus crassior, in vertice

gemmula albicante ornatus. Florum *Gemmæ* oblongæ, quinque vel sex costulis eminentibus striatæ, nonnihil intortæ, vel, si mavis, crispatæ; illarum folia primum pellucida sunt, ac clara, veluti alæ papilionum, nullo cæruleo colore tincta; tractus in illis videntur subtiles venularum, quæ in plures se spargunt ramulos, & hinc inde ex *costa* media oriuntur, sed illæ, in foliis cæruleis & scintillantibus, visum fugiunt. *Capsulæ* seminales trilateræ, oblongorotundiolæ, tribus in longum striis radiatæ, à foliis, tum costulis valde crassis & extuberantibus, ac præ ficcitate contractis & rufofuscis, instructis, in totum comprehensæ. Numerosa in illis continentur *semina*, in tres series disposita, per membranam internam tenuem, quæ ex medio fructus, ad intervalla, inter strias intermedia excurrit, ac corticis exterioris striis arctius adstricta est, distincta, formâ rotundiola, parum oblonga & albicantia, matura colorem feminis referunt *Nasturtii*. Tota planta contrita & in lacte data, febri medetur colericæ. Oculorum affectus tolluntur, si caput cum illius decocto ungatur & oleo. *Radix* cocta cum *saccharo* assumpta, vitia hepatis corrigit, flatu dissipat; trita in *butyro* & oleo & sic epota inflammationem seu rubedinem oculorum tollit. *Cortex* radicis in pulverem reductus cum *Zaccharo* sumtus antiasthmaticum est; idem masticatus & in ore detentus odontolgiam sedat & abigit.

T A B. 44.

Secundum descriptionem clarissimi nostri Authoris pertinet hæc planta inter illas quæ sunt flore hexapetalo, tricapsulares, radice fibrosa. Sed de- lineator florem tantum depexit pentapetalum, cum tamen secundum descriptionem hexapetalus sit.

Euli-tamara Lat.
കുളിതമരം Mal.
فحوفج نامهر Arab.
आळ bram.



CULI TAMARA.

TABULA XLV.



Lertia species *Tamara*. *Radices* quibus fundo adhæret, fibræ sunt capillatæ, in unam quasi fasciam conjunctæ, albicantes; adultiores tunica flava obductæ, annularibus sese striis corrugantes. *Caules* crassi, fistulosi, admodum leves, ad radicem crassiores, superiora versus in angustum contracti, angulati, intus aliquo modo lactei. *Folia* singula ex summitate caulium protenduntur, è caule, versus posticam partem, duabus laciniis tanquam alis (quæ singulæ in cuspidem sese stringunt) longe excurrunt, ac versus anteriora, rotundis oris, in obtusum sese contrahunt cuspidem; lata sunt, & interiora versus se nonnihil claudentia, ejusdem in utraque parte viroris, spinis minutis obsita, maxime in adversa parte, ubi etiam aspera, fractu facilia. *Costæ* ex caule tredecim plus minus excurrunt, quarum aliæ versus posticam partem, in laciniarum seu alarum deferuntur cuspides; aliæ, cum *costa* intermedia crassiori, versus obtusum folii cuspidem, hinc inde nervulos emittentes transversos; omnes in utraque parte eminent, maxime in adversa, nervulis transversis exceptis, illi enim in adversa tantum eminent, in recta conspicui. *Flores* in propriis geniculatis proveniunt caulibus (illi minutissimis sunt obsiti pilis ac valde asperi; ex inferiori geniculo, ubi tribus foliis cinguntur parvis, oblongis, cuspidatis, & ut folia *graminum* in longum striatis, tres aut quatuor emittunt cauliculos geniculatos) prorumpuntque è singulis caulium geniculis, plures simul, tenuibus, rigidiusculis ac nonnihil surrectis petiolis; parvi sunt, tripetali, illa latorotunda sunt, interiora versus cochleata, candida, parum scintillantia, à se mutuo nonnihil distantia; unguiculis suis tenuioribus, *nodulo* seu *capitulo* viridi, gemmu-

Sagittaria obtusifolia, Pers. Syn. 2

mulis interstincto, è petiolo extuberanti, circumposita; è quo *stamina* egrediuntur plura, brevia, tenuia, albicantia, oblique surrecta, ex inferiori parte sex flavis *apicibus* dotata; ipsa florum petala tribus viridibus succinguntur foliolis. *Capitulum* in gemmas extuberat majores, rotundas, valde nitentes & transparentes, asperas, acuta prominente futura, in medio striatas; in hisce, quæ aqueæ sunt, intersepimentum est viride & crassum, utrinque ad latera cavernulam relinquens, in qua duo albicantia reconduntur *semina*. Ignoti usus est hæc planta apud Indos.

T A B U L A 45.

Quamvis Auctor noster dicat hanc tertiam *Tamara* esse speciem, quarum duæ priores Tab. 30 & 31 descriptæ, & conspecies sint *Nymphaea*; nihilominus tantum referri debet ad *Sagittam La-*

tifoliam B. P. hoc enim ex omnibus apparet circumstantiis; atque ideo à me vocatur *Sagitta Indica major*, folio obtuso, floribus minoribus albican-




Ottel-ámbel lat.

ഒട്ടെലമ്പൽ mal.

أظفارة العرب. arab.

ଆଞ୍ଜୁ bram.



M A L A B A R I C U S.
O T T E L A M B E L.

95

Ottelia alba munda Pers.

T A B U L A X L V I.



Uarta species *Ambel*; Bramannes dicunt *Odeca-aloën* à prioribus quam maximè differens. *Radix* rotundi instar nodi est, cujus *cortex* flavus, plurimas tenues flavasque emittens fibras, etiam ad ulteriorem propagationem, novam proferens radicem. *Caules* è radice exeuntes, simplices sunt, teneri, fistulosi, sed crassiores & angulati, viridi diluti, albicantes. *Folia*, ut illa priorum specierum, caulibus non insident, sed singula ex suo rectà protenduntur caule, neque etiam aquis innant vel incumbunt, sed oris, inferiora versus, convolutis & ad se invicem contractis, tum sub aquis, tum extra aquas emicant; maxime in latitudinem extensa, rotundis ad caulem oris, antè in cuspidem strictis, valde rigida, fractu facilia, in lacinulas hinc inde infinuata, glabra. Cum *nervo* intermedio venulæ majores, ex ipso caule, utrinque tres quatuorve passim, obliquo & arcuato exeunt ductu, quo, à margine deflectentes, in cuspidem deferuntur, in adversa eminentes, rectam striantes. *Flores* caulibus insident propriis quadrangulatis, in singulis unus numero; qui caules, parte superiori, proxime ad flores alati sunt, stricti nempe quinque alis majoribus, latis, rigidis, foliorum instar, ac minoribus intermediis. Ipsi flores candidi sunt, difformes, tripetali, lenes, crispatis, venulis in longum striati. *Stamina* flava sunt; inter illa *capitulum* sese prodit cuspidatum; inferius tribus succinguntur foliis viridibus, angustis, surrectis, cuspidatis, quæ ubique viridi fuscis sunt obducta nervis. *Capsulæ* seminales rotundæ, oblongæ, cuspidatæ; *semina* in illis reperiuntur numerosa, rotunda, minuscule, coloris, ubi matura sunt, rubescentis. Hæc ut & illa reliquarum specierum in eduliis adhibentur.

T A B. 46.

Cæteræ plantæ cognomen *Ambel* gerentes, priores enim omnes conspecies sunt *Nymphaea* mi- paulo ante Tab. 26, 27, 28 & 29 descriptæ, cum noris, ut suo loco notatum. Hæc mihi est *Sagittaria* affi- hac ne minimam quidem habent convenientiam, nis *Malabariensis*, latissimo folio, floribus ex albo trifoliatis.

P. XI.


A a

TSJEM

Tjem-cúmúlú Lat.

മല കുമളി Mal.

وَمِنْغُ فُحُولُ Arab.



T S J E M C U M U L U.

T A B U L A X L V I I.



Renoso hæc planta gaudet solo, longe excurrens. *Radix* albicans est & fibrosa. *Caules* è radice plures exsurgunt simplices, rotundi, rigidiusculi, lignosi, aquei, ex albo flavescentes, venis tribus striati. *Foliis* destituitur. *Flores*, diffformes, cacumini caulium, qui superne paulo crassiores, ad unam partem nonnihil inflexi, insident transversi, bipetali; unum illorum rubro sanguineum & purpurascens, interius in orificio, unctuofo liquore delibutum; alterum, (exterius nempe) cuspidatum est, incurvo dorso, lateribus clausis, coralline rubescens, inferius ex ventre emicantem proferens campanam; illa ventre nonnihil est plano, stricto dorso, quo petali cuspidati dorsum respicit. In illius orificio *stylus* conspicitur crassiolus, albo rubescens, cujus *capitulum* albo flavescent, planum, rotundum, pilis minutis albicantibus obsitum; cum *stylo staminum* duo reperiuntur paria, rubescentia, *apicibus* albicantibus, latis, sibi mutuo annexis dotata; ad latus campanæ florum inserta. Insuper notandum quod *stylus* ex globulo exsurgat grandiusculo, rotundo, in basi *calycis* sito; estque hic globulus albo flavescent, tunica membranacea rubescente, quæ facile deglubitur, obductus; transversim dissectus ex carnosissimis humidis plicis conformatus esse videtur. *Folia* cum *Nuce Moschata* *Zaccharoque* gingivis applicata, dentium putredinem arcent, eorumque vermes enecant. Ex foliorum simul & ligni *succo* ellychnia parantur, quæ oleo foliorum d'*Emferno* intincta accensaque, leves relinquunt cineres, qui palpebrarum aliorumque partium suffocant vermiculos; *Bulbus* radice idem præstat, cum *Sandalo* pone aures & in fronte applicitus; pulverisatus nempe & tostus.


Vacmbu Lat.

வெம்பு Mal.

Wecandá

वेरवड bram.

والبجاء Arab.



V A E M B U.

T A B U L A XLVIII.



Lingua Bramannum *Bembi*, planta aquatica est. *Radix* suavissimi odoris, saporis peracris, numerosas, flavescentes, capillatas, ab una parte versus inferiora, emittens fibras, in longum proserpens, sicca, molli & albicante cuticula, corculum habet, signatura flava annulari, ab interiori carne interstinctum, per novos oculos qui è radice protuberant propagatur. *Folia* ex nodis radicis transversim proveniunt, lato oblonga, vel oblongo angusta, tres quatuorve pedes æquantia, ad unam partem clausa, atque ibi tunica albicante obvelata, venis subtilioribus striata, radicem, pedibus flavescentibus ac mutuo convolutis, investientia; saporis ac odoris acris. *Folia* cum *Zinzibere* sicco trita artuum lancinationes & arthricos dolores ex pituita salsa & acri, mitigant. *Radix* in carbonem exusta & in pulverem redacta dentifricium est, quo si gingivæ, superpota *Oryzæ* aqua perfricentur, Cynicus curatur spasmus. Idem pulvis, cum convenienti liquore assumptus, cholerae medetur; imò contra colicos & ventrem lancinantes, assumitur dolores. Comestus prostratum appetitum tam efficaciter excitat, ut etiam salivam moveat. In aqua lævigatus & propinatus imò pro balneo adhibitus epilepticos sanat infantes.

T A B U L A 48.

Acorus hæc est verus Asiaticus radice tenuiore, vel *Calamus Aromaticus Garzia* ab Horto. Ab omni parte convenit cum *Acoro* vero officinarum, sed folia parum angustiora sunt quam *Acori* nostri, qui magna copia ad ripas aquarum dulcium invenitur, & multoties quotannis suos profert julos.

Pl. modécca Lat.

പാമരമുള Mal.

عل مغضاقو Amb.

കുളവാലി Lam.



PALMODECCA.

TABULA XLIX.



Ecunda species. *Modecca*; Bramannes dicunt *Cuvali*, convolvulus est nascens in arenosis. *Radix* crassa, tuberosa, cubitum longa, intus albicans, lactea, mollis, minus lignosa, exterius nigricans, fibras tenues hinc inde emittens, odore & sapore glandes æmulans terrestres. *Caules* tenues, lactei, vetustiores cinerei, sub exteriori crusta virides, parum lignosi, tenuiores virides, ex una parte valde rubescentes, glabri, nitentes, humidi. *Folia* hinc inde, in petiolis, interius striatis & rubescentibus proveniunt, singula septem laciniis interstincta & divisa, in recta parte viridi fusca, nonnihil nitentia, in adversa viridi clara, mollia, lactea. *Costa* in recta parte etiam eminens ibi rubescit, ad singulas transiens lacinias, in adversa viridi clara est. *Flores* in petiolo communi, plano, nonnihil incurvo, rubescente, spithamam longo, ex origine foliorum exoriens, brevibus suis pediculis plures congregati proveniunt, campanulæ sunt purpureo rubræ, ex collo, stella quinque oblongorum cuspidum, qui proxime ad oram excurrunt, & venulis in longum striantur, signatæ; ipsi cuspides in collo intense purpurei, in extremitatibus purpureo rubro diluti; exterius ex purpureo albicantes, in stella nitentes, nullius odoris. *Stamina* in illis emicant quinque purpureo albicantia, *apicibus* oblongis, surrectis, albicantibus & farinaceis dotata; *stylus* tenuis est & albicat, rotundum, crassum & farinaceum in vertice gerens *nodulum*, qui ex rudimento fructus, in calyce sito, exoritur. *Calyx* pentafolius est, collum campanæ arctissime complectens; singula folia, rotundiolæ vesicæ instar, inflata sunt, rubro fusca, ad persicum colorem vergentia; deciduis floribus se arctissime claudunt, fructumque, etiam cum maturus est, maximam

Convolvulus paniculatus, L.
Pers. syn. 1. 180

mam partem comprehendunt, sed tum viridia sunt. *Fructus* baccæ sunt rotundiolæ, calycis foliis maxima parte arctè obtectæ, superiori parte rufi, interiori virides, quatuor subtilioribus venulis in longum striatæ, ac veluti in tot loculamenta divisæ, quorum duo à duobus reliquis, membrana tenui intermedia, separantur. *Semina* in singulis unum, ad partem corticis argenteis filamentis oblitum, irregularis figuræ, duorum triumve laterum, pulpa interior ex flavo albicat. *Radix* in sole siccata, trita, in pulverem redacta, cum *saccharo* & *butyro* decocta & assumpta, macilentos fertur reddere & obesos; sed & immodicum mensium sistit fluxum, & in febribus ossium confert.

T A B. 49.

Ad cæteras *Modecca* species, de quibus *part. octav.* etiam & hæc pertinet; ubi & una eodem nomine *Pal Modecca*, id est, *Modecca altera* describitur: in eo differens quod hujus *flos* ex omni parte, omnium sit maximus. Ad præcedentes nullas dedimus annotationes; nec mirum, apud omnes enim *Botanographos*, maximum de illis est silentium. Ast cum postea vidissem *Clariss. D^o. Breynium prodrom. 2. pag. 48.* omnibus nomen

dedisse, *Floris passionis spurii Malabarici* (omnes enim, pro spuriiis habet speciebus,) hæc appellari posset *Flos passionis spurii Malabaricus, flore majore, fructu minore.* Observandum est quod folia omnium specierum *Modecca*, & uniuscujusque speciei, quam maxime inter se invicem differant; in uno enim eodemque caule invenies, quæ non, & quæter, quater, quinquiesve sunt divisa; Ita ut solum discrimen sit in *floribus* & *fructibus*.



Munda-valli Lat.

മുണ്ടാ വള്ളി Mal.

موندنا والي Amb.



MUNDA VALLI.

TABULA L.



Convolvulus, arenosa amans, arboribus sese affigens. *Caules* rotundi, virides, non geniculati. *Folia* in petiolis oblongis, crassis, interius striatis, viridibus, proveniunt, novellis furculis hinc inde comitata, formam referunt cordis, anterius cuspidata, ad pediculum sinu excisa, mollia, lenia, viroris in recta parte fusci, in adversa diluti, trita odoris gravis, nullius saporis. *Costa* media lata est, plana, viridi albicans, una cum lateralibus in utraque parte eminens, maxime in adversa. *Flores* ad exortum foliorum duo vel tres juncti proveniunt in petiolis oblongis, crassis, virididilutis, tortuosis, monopetali, prægrandes referentes campanas, oblongo-angusto, viridi diluto collo è calyce exsistentes, lato & amplo orificio, stella quinque oblongorum cuspidum, qui exterius extuberant, striati, ex superiori colli parte, ubi rugulis leviter crispantur, contextura tenui & transparente, valde lenes & molles, coloris nivei nitentis, visu jucundissimi; stella exterius viridis est; odor ut *Lilia* nostratum. *Stamina* ex illis emicant quinque, candida, nitentia, quæ ex inferiori colli parte, cui interius quasi assuta sunt, *apicibus* decumbentibus albis, alba farina aspersis, dotata. *Stylus* ex calyce exsurgit liber, candidus, crassus, super stamina, cum suo rotundo, albo ac farinaceo emittens *capitulo*. *Calyx* quinque folius est, illa oblonga sunt, stricta & cuspidata, coloris viridi nigricantis, florum colum arcte excipiens. *Florum gemmæ* oblongæ, conicæ, viridi dilutæ. *Fructus* ad exortum foliorum brevibus insident petiolis, oblongorotundi, cuspidati; teneri virides, carne intus viridi, succulenta, intus cavitate angusta, grati odoris, cortice crassiusculo obducti. *Ufus in Medicina* nullus vel saltem ignotus.

TABULA 50.

Pertinet inter species Convolvuli. Ego dicerem *Convolvulus Malabaricus flore amplo viridi diluto colore.*

P. XI.


Cc

KAT-

Kattú - Keléngú Lat.

കാട്ടുകലേങ്ങ Mal.

قحاطو غبيره نغيا Arab.



ooooo

K A T T U K E L E N G U.

T A B U L A L I.



onvolvulus arenoso gaudens solo. *Caules* rotundi, virides, pilosi, parum lignosi & languidi. *Folia* in petiolis oblongis, rotundis, pilosis, viridibus, ex parte spadiceis, ac fusce rubescentibus, caule crassioribus proveniunt, forma cordis, antequam brevi cuspidem, ad petiolum excisa, parum pilosa, ob pilorum hirsutiem in recta parte aspera. *Costa* media cum lateralibus in adversa eminet parte. *Flores* in petiolis rotundis, pilosis, supra exortum foliorum prodeuntes, cyathiformes sunt, stella quinque cuspidali, ex albo viridi diluta, ex orificio in oram signati, albo flavescentes, in orificio colli fusce rubro purpurei, lenes, in tractu cuspidum stellæ exterius pilosi, nullius odoris, infra calycem in geniculis petiolis, duobus angustis foliolis succincti. *Stamina* ex fundo colli exsurgunt quinque candida, oblongis, albo flavis, surrectis *apicibus* dotata. *Stylus* candidus est, superius duabus rotundiolis, candidis nodulatus gemmulis. *Basis* cui stamina insident, quinque rotundiolis fenestrata est cancellulis. *Calyx* pentafolius est, folia ipsa cuspidata sunt, surrecta; illorum tria ampla sunt & lata, duo interiora angusta. Floribus deciduis succedunt *globuli* rotundi, qui sicci, coloris cinereo fusci, quatuor continentes *semina* intersepimentis mediis à se mutuo separata; trigona sunt, uno rotundo, duobus interioribus planis, ejusdem cum globulis coloris. *Folia* cum *Codiavanacu* & recenti *butyro* trita abscessus maturant & aperiant. *Radix* cum *aqua Oryzæ* levigata erisipelati resistit.

T A B. 51.

Parte septima hujus operis pag. 71. alia, ejusdem nominis describitur planta, quæ cum hac nostræ ne minimam quidem habet convenientiam; illa enim pertinet inter species *Batatas Sylvestris*, uti suo loco ostendimus; hæc species *Convolvuli* est. Quamvis autem nota Characteristica *Convolvulorum* sit quod Capsulæ seminales sese in tres

partes aperiant, sed illæ hujus plantæ in quatuor dispertiantur; nihilominus tamen proxime ad illos accedit, & licet claviculis, quas habere oportet, destituatur, secundum descriptionem DD. Rayi Hist. Plant. Tom. I. lib. 15. cap. 4. tamen illi nomen dedi, *Convolvuli affinis Malabarici*, floribus pilosis, variegatis.

Convolvulus malabaricus
L. sp. 221

Ballet la.

ബാളെട് Mal.

Taka sivali

तकासिवाळी bram.

تاکا سیلی Arab.



B A L L E L.

T A B U L A L I I.

*Convolvulus repens
L. sp. 225*

Allel; Bramannes dicunt *Takasivalli*, convolvus est, cauliculis super aquam repens, ac ex illarum Cymis capillatas, viridisubalbicantes emittens *radices*; illæ, pedunculos caulium obsidentes, ex pluribus constant fibris capillatis, candidis, saporis aquei. *Caules* tenues, teneri, aquei, virides, cymis inflexi, ex cymarum convexa parte, unde & radiculæ prodeunt, folia ac flores emittentes. *Folia*, quæ longis, rotundis ac viridibus petiolis proveniunt, hastiformia sunt, postica parte in pedunculos laterales exporrecta, ad eorum oras nonnihil sinuata, textura crassiuscula, viroris in recta parte fusci, in adversa diluti. *Costa* media cum lateralibus in recta maxime eminet parte, minus in adversa. *Flores* monopetali sunt, stella quinque cuspidali notati, in stella ejusque cuspidibus candidi, interius purpureo rubescentes, exterius purpureodiluterubescences. *Stylus* ex orificio calycis emergens candidus est, in *apice* *gemma* albicante farinacea nodulatus; cum illo quinque emicant *stamina*, oblongis, albicantibus, farinaceis dotata *apicibus*, lateri inferiori colli inserta, in ima parte, ubi crassiora, rubescentia, pilisque albicantibus barbata. *Gemmæ* florum oblongocuspidatæ, viridisubflavæ. *Fructus* rotundioli, & tribus veluti rotundis lateribus extuberantes, in cuspidem brevem & angustum striati; teneri adhuc oblongiores sunt & magis cuspidati; maturi magis ad latera extuberant, coloris viridi albicantis, quinque foliis viridibus & acuminatis *calycis*, maxima parte, præcipue autem ad extuberantias, excepti. *Semina*, in illis continentur tria, intersepimentis candidis à se mutuo distincta, trigona sunt, uno exteriori latere rotundo, duobus interioribus planis obtuse concurrentibus; fabam in se continent viridem,

dem, anteriori parte in duos lobulos unguatim, per intersepimentum medium, in medio fissam; in convexa parte umbilico seu oculo viridi, qui versus planam partem inflexus velut in sinum sese recipit, dotatam; faba hac resoluta, ex oculo viridi, tanquam communi pedunculo, duo plani conspiciuntur foliosi lobuli, qui singuli in duo folioso, crispa relaxantur linteola. *Planta* cum ebutyrato lacte oleoque simul cocta lumborum abscessus sanat, dolorem mitigat.

T A B U L A 52.

Convolvulus mihi est *aquaticus* folio longiore, floribus candidis.




Tirú-táli Lat.

കേരളം Mal.

طير حو طغلي Arab.

അട bran.



TIRUTALI.

TABULA LIII.



Convolvulus sinuosis ramis arboribus se affigens, arenoso & terreo gaudens solo. *Radix* tenuis, fibrosa, longe excurrens, cortice albicante, cujus sapor subdulcis. *Cauliculi* rotundi, tenues, virides, rubescentes, raris pilis obsiti. *Folia* hincinde, ex diversis cauliculi partibus, petiolis crassioribus, longiusculis, teneris, viridiclaris, interius striatis, nonnihil rubescentibus, proveniunt, figura instar cordis, postica parte ad petiolum rotundis oris profunde incisa, in cuspidem angustum contracta, tenuia, mollia, superficie lenissima, in margine subrubro limbulo circumdata, in recta parte viridifusca. *Costa* media cum lateralibus in marginem progressa in brachia divaricantur, in adversa parte maxime eminent, ubi viridifusciore sunt & nitentes. *Flores* in longis, tortuosis, virididilutis petiolis, qui cauliculis, ex quibus oriuntur, crassiores sunt, ex origine foliorum prodeunt, septem, octo, plus minus congregati, monopetali, albicantes & purpurascens; illorum collum oblongoangustum est, in illo purpureo rubri sunt; extra illum purpureoalbicantes & nitentes; ex inferiori colli orificio stella notati, cujus cuspides ad oras deferuntur & ibi pereunt, nullius odoris. *Stamina* in illis quinque candida, tenuia, collo inserta, *apicibus* flavis & surrectis dotata. *Stylus* candidus est & tenuis, duabus *gemma* in vertice nodulatus, ortum habens ex globulo viridi, fructus rudimento, in fundo *calycis* sito; ille, collum florum arcte arripiens, viridis est, pentafolius, rotundocuspidatus. *Florum gemmae* virides & cuspidatae. *Fructus* baccæ sunt rotundæ, aliquo modo planæ, primò virides, exinde flavæ seu rufæ, quatuor venulis vel lineis striatæ, in quibus *cortex*, qui duriolus est & tenuis, in quatuor se relaxat partes. *Semina*
in

in illis quatuor, tenuibus à se mutuo interstincta mem-
branis, de cætero trigona sunt, uno rotundo, duobus
planis lateribus, coloris castaneo fusci, ex oculo in verti-
ce, fila ejiciunt candida, tenuia. *Succus* expressus pro
lotione adhibetur, ad purificationem corporis.

T A B. 53.


Convolvulus Malabaricus floribus ex albo purpurascens.



Ben-tirú-táli Lat.

ബെൻ തിരൂ താലി Mal.

وَمِنْ طَبَرُو حَقْلِي Arab.



BEN-TIRU-TALI.

TABULA LIV.



Convolvulus nascens in arenosis. *Caules* tenues, rotundi, virides, glabri. *Folia* oblongo rotunda, crassiuscula, mollia, lenia, odoris debilis & grati, saporis subacris. *Costa* media in utraque parte eminet, laterales in recta extuberant, in adversa tractibus suis conspicuæ. *Flores* monopetali, companiformes, stellati, quinque cuspidales, oblongo collo, candidissimi. *Stamina* in illis quinque surrecta, candida, *apicibus* incumbentibus & candidis nodulata, inferius pilis candidis barbata, collo assuta. *Stylus* oblongior *gemma* albicante instructus; ex *globulo* viridiflavescente, in *calyce* sito emergens; ille quinque folius est, tria illorum ampla & oblongo rotunda, duo angusta & cuspidata sunt. *Fructus* oblongi, filamentum oblongum, viridi dilutum in vertice gerentes; inter quatuor surrecta, scabra, rigida, & viridia folia, calycis locum adimplentes, consiti, illorum cortex crassiusculus & viridi dilutus, intus valde glaber & albicans; in medio mollissima, flocculosa, albicans continetur lanugo. Ex *succo* plantæ in seßus præparatur, adversus morbum endemium, *Pitao* dictum: idem cum *fructu* ac *cortice Cadel-avanacu* haustus, alvum laxat.

TABULA 54.

Convolvulus Malabaricus, folio longiori, flore candido.


Tala-neli Lat.

கலந்தி Mal.

Calivalli

காக்காவி Bram.

طالنجين Arab.



T A L A - N E L I.

T A B U L A L V.

Bramannes dicunt *Cali-Valli* vel *Rain Ma-*
morad, convolvulus est arboribus se affigens,
 vel super terram repens. *Radix* lignosa,
 fibrosa, cortice viridifusco. *Caules* tenuis-
 simi, angulati, virides, ad corticem inte-
 rius membrana albicante, densa, subtilissi-
 mis pilis pertexta, vestiti. *Folia* oblongoangusta, cuspidata,
 ad petiolum utrinque pedunculo laciniata, tenuia, mol-
 lia, lenia; *Costa* in adversa parte eminente instructa, viro-
 ris communis, nullius saporis. *Flores* monopetali sunt,
 stella in medio ornati, cujus cuspides in ora nonnihil emi-
 nent; albicantes, subflavescentes, in collo nota rosaceo-
 satura in orbem suffusi. *Stamina* in illis quinque tenuia,
 candida, albicantibus, surrectis *apicibus* instructa. *Stylus*
 tenuis est; illius *capitulum* virididilutum, in duas veluti
 pennas bifidus. *Calyx* quinque folius est & cuspidatus,
 florem arcte arripiens. *Fructus* globuli sunt planorotundi,
 ex albicante virididiluti, striati, ex futuris, per membra-
 nas intermedias, in quatuor loculos seminales distincti,
calyce quinque oblongorum & cuspidatorum foliorum
 profunde excepti, coloris ruffi & spadicei ac nonnihil ru-
 bescentis. *Semina* in iis reperiuntur quatuor, in singulis
 loculis unum, triangularia, uno latere rotundo duobus
 planis, primum albicantia, exinde spadicea. Decoctum
 hujus plantæ, *Samstravari*, *Glycirrhiza* & oleo *Sergelim*
 permixta linimentum præstat, quo caput illinitur adver-
 sus cephalæam & comæ fluxilitatem.

T A B U L A 55.

Miratu dignum, quod omnes *Convolvuli* spe-
 cies, huc usque descriptæ & quæ imposterum
 sequuntur, claviculis destituantur, & plerum-
 que quatuor vel plures habeant loculos in capsu-
 lis seminalibus. Ex genere *Convolvulorum* ta-
 men minimè sunt excludendæ, sed necessario
 inter illos recensendæ, cum illis enim quam
 maximè conveniunt. Hæc mihi est *Convolvulus*
Malabaticus, angusto folio, flore variegato.

Argemone (Riviera) liliifolia
(Panicum)
Spornia campoculata Wight

Pars 11. Tab. 56.

Adamboe Lat.

അടം മാ.

ءضخامبجو Arab.

वदवली bram.



A D A M B O E.

T A B U L A L V I.



Res illius sunt species, *Adamboe*, *Schovanna Adamboe* & *Bel Adamboe*; prior lingua Br-
mannum dicitur *Pougia-Valli*, convolvulus
est, cujus *radix* fibrosa, albicans. *Caules*
rotundi, tenues, minutis pilis obsiti; super
terram repentes, radículas, quibus se affigunt,
emittentes. *Folia*, quorum petioli striati & pilosi, cor
referunt, textura tenuia, mollia, superficie lenia. *Costa*
media cum lateralibus in adversa parte eminet. *Flores* in
uno petiolo plures congregati proveniunt, monopetali,
in quinque partes incisi, corrugati, stellati, in collo pur-
pureo rubri & saturi, exteriora versus ex purpureo albes-
centes, sine odore. *Stamina* in illis quinque albicantia,
apicibus oblongis, surrectis, albicantibus & farinaceis do-
tata; in inferiori colli orificio, cui inserta sunt, crassiora,
albis & lanuginosis pilis obducta. *Stylus* inter illa apparet
tenuis & albicans, crassa & farinacea *gemma* in vertice no-
tatus, ex *capitulo* flavo, fructus primordio, erumpens.
Calyx pentafolius est. *Fructus* nonnihil planorotundi,
foliis calycis arctissime inclusi, in vertice caudula eminen-
tes, tribus seu quatuor lateribus rotundiolis, ac in latum
nonnihil extuberantibus, cortice primum viridi, in supe-
riori parte, ubi calyce non obteguntur rubescentes, odoris
ubi aperiuntur, fortis, illum *Piperis* & *Zinziberis* vi-
ridis æmulans. *Semina* in illis tria vel quatuor, fructum
replentia, trilaterialia, intersepimentis tenuibus, mem-
branaceis, albicantibus, quæ in oris rubescunt, à se invi-
vicem sejuncta, coloris argentei; in oris lateris convexi,
pilis argenteis obsita; pulpa viridis est & nullius saporis.
Contrita cum lacte assumpta, antidotum est adversus mor-
sum serpentis *Cobra Capella* dicti; fructus triti & cum aqua
assumpti, idem præstant.

T A B. 56.

Parte quarta hujus Operis Tab. 20. 21. & 22. arboris species eodem nomine *Adamboe* descri-
buntur, quæ multum inter se differunt, quamvis
omnes sint species *Malva arborea*; & sic plures in
hoc opere reperiuntur plantæ, uno eodemque

nomine insignitæ, nullam tamen inter se conve-
nientiam habentes, uti antea demonstravimus:
Hæc mihi est *Convolvulus Malabaticus flore maximo*
purpurascens.

Schoránna adámbu Lat.

ചെടവത്തുണ്ടായ Mal.

جبوانحاء و صفا مبحو Arab.

बागडावले Bram.



SCHOVANNA ADAMBOE.

T A B U L A L V I I.



Ingua Bramannum *Bangada-Valli* convolvulus est priori pene similis, excepto quod folia sint bifida, *flores* paulo minores, ut & *fructus*: *semina* pilis in totum villosa vel lanuginosa; ubi maturuere in pilis spadiceo fusca, lenitie instar *Veluti*, sub pilis duro, osseoque cortice obtecta. In aqua decocta fomentum exhibet quo dolores arthritici mitigantur. *Folia* cum *lacte caprarum* in potionem præparata, pro hæmorrhoidibus propinantur.

T A B. 57.

A^o. 1690. Convolvulum hunc in Horto Medico ex semine produxi & est *Convolvulus Maritimus* *Cat. Hort. Lugd. Bat. Ceylanensis* *Bitamburū*; *Lusitanis* *Pes Capra* dictus. *Ceylanicus* folio crasso, bifido; seu cordi formi. *Herman.*




Bel-adambu-valli Lat.

வெள்ளை மா. Mal.

Dangado-valli

बागडवाले bram.

بهارء ضحائبو arab.



B E L - A D A M B O E.

T A B U L A L V I I I.



Convolvulus nascens in petrosis, radiculis albicantibus terræ sese affigens. *Radix* ruffa, intus nonnihil lignosa albicans, in longum excurrens, tortuosa, fibris vestita; illius *cortex* saporis est subdulcis & subacris, odoris terrei. *Caules* rotundioli, virides, flexiles, parum lignosi, albicante medulla. *Folia*, quorum petioli sulco striantur, ad exortum proveniunt radicularum, forma lati & obtusi cordis, circa petiolum angulato sinu excisa, crassiola, mollia, lenia, viroris in recta parte furdi, in adversa dilutioris, *costis* crassis instructa, nullius odoris vel saporis. *Flores* campaniformes sunt & stellati, floribus *Adamboe* per quam similes, sed in totum candidi. *Stamina* in illis quinque surrecta, *apicibus* oblongis, candidis, surrectis dotata. *Stylus* gemma nodulatur candida, rotunda & granulata. *Calyx* pentafolius est, tria illorum oblongiora sunt & virididiluta, duo minora & viridifusca. *Globuli* in calyce conspiciuntur seminales, quorum vertex filamento coronatur oblongo, tenui, ubi cæruleo fusci, ad calycem albicantes. *Semina* in illis tria vel quatuor triangulata, oblonga, superiori parte in cuspidem stricta, coloris cinereo fusci, intra pulpam unicum, parvum & rotundiolum recondentia nucleum, odoris & saporis fabacei. *Succus* cum oleo *Maro* & *Zingibere* decoctus, linimentum præstat, capiti inunguendum, quo morsus rabidi canis irritus redditur.

T A B U L A 58.

Convolvulus Malabaricus folio rotundiore, crasso, flore candido.

Pulli-schoradi Lat.

புலி-சுரடி Mal.

پولی حیو کاغی Arab.

अरु Brun.



P U L L I - S C H O V A D I.

T A B U L A L I X.



Ramannes dicunt *Arty*, convolvulus super terram repens vel etiam arbores scandens. *Radix* brevis, rotunda, tenuis, aquosa, virididiluta, fibras numerosas barbatas à laterc emittens. *Caules*, palmitum more super terra currentes, nullasque claviculas ejicientes, teneri sunt, duri, flexiles, pilosi, asperi, sub pilis virididiluti; pili ipsi longiusculi & subflavi, coloris *Xerampelini*. *Folia* etiam pilosa sunt, in sex, septem, vel etiam plura folia rotundo cuspidata incisa, omnia *Costa* media & lateralibus instructa, crassa, virididiluta, saporis & odoris sylvestris. *Flores* quorum petioli longiusculi, virididiluti pilosi & asperi, circa originem foliorum proveniunt, ex crassis, foliosis, virididilutis, & cyathiformibus *calycibus*, campaniformes, angusto collo, coloris candidi & nitentis, versus superioriora crispati & corrugati, venis subtilioribus in longum striati, pilis rarissimis obsiti. *Stamina* in illis visuntur quinque tenuia, recta, candida, albis & surrectis dotata *apicibus*. *Stylus* candidus est & longiusculus, in vertice *gemma* alba ornatus. *Calycis* folia angusta, hirsuta, viridia, inferius albicantia. *Semina* in gemmis continentur quatuor, quæ *gemma* tenuibus nervis in quatuor se dividunt latera; ipsa semina oblonga sunt, trigona, parum pilosa, primo albicantia, exinde fusca. *Folia* cum *Pipere* trita & parti affectæ imposita, omnem virulentiam, à morfu canis rabidi contractam, amonent; cum *butyro* trita apostemata resolvunt.

T A B U L A 59.

Convolvulus Heptaphyllus Indicus Villosus. Breyn. Prodr. 1. Vel *Convolvulus Ceylanicus Villosus pentaphyllus* & *heptaphyllus minor*, Cat. Hort. Acad. Lugd. Batav.


Tsjúria - cránti Lat.

சுருதி மல.

Tsjúria - cránti

सुवकादी वृक्ष.

شجر ریاحی از طبرستان Arab.



TSJURIA-CRANTI.

TABULA LX.



Onvolvulus cujus *radix* albicans fibrosa & capillata. *Caules* tenues, intorti, virididiluti, nitentes, aquei, cymis inflexi, ex cymarum adversa parte, caules ejicientes tenues, foliosos, virides; etiam & ipsi foliosi sunt, una parte nonnihil sulcati, certo ab exortu intervallo, foliis vestiti, in medio sulcatæ partis velut nervulo obsiti. *Folia* angustissima, oblonga, graminiformia, crassiola, in recta parte viridifusca, nervulo tenui eminente instructa, in adversa viridi dilutiora & nitentia. *Flores* prodeunt in cauliculis oblongis, tortuosis, viridibus, qui cum cauliculis foliosis, ex cymis caulium emicant, & superiori parte nodulis extuberant, ac sæpius in nodulis in binos divaricantur pedunculos, & ad florum confinia nodulo crassiori turgescunt. Ipsi flores stellam referunt quinque cuspidalem, oblongo, angusto collo, in totum purpureo rubri, intus in foliis coloris purpurei scarlatini venustissimi, odoris expertes. *Stamina* in illis quinque rubra, nitentia, rubris & oblique decumbentibus *apicibus*, candido, farinaceo rore aspersis, ornata, colli inferiori parti inserta. *Stylus* albicans, inferius viridis est & crassiusculus, candida & farinacea *gemma* instructus. *Capsulæ seminales* oblongorotundæ, antè in cuspidem obtusum strictæ, tribus quatuorve futuris striatæ, primum virididilutæ, exinde ruffæ, *cuspidem* in vertice gerentes oblongum, primo viridem, postea durum & ruffofusculum; membranaceis intersepimentis in tres quatuorve valvulas distinctæ. *Semina* in principio albicant, sicca nigricant, oblonga, nonnihil angulata. *Philtro* efficaciam huic plantæ tribuunt incolæ. *Succus* è foliis expressus errhynum est cephalalgiam fugans.

TABULA 60.

Tsjuria-Cranti Malabariensis est *Cnamocliton* sive *rison* in Hist. Oxoniens. recte vocatur *Convolvulus ex-Fasminum Americanum*. Clus. Cur. Posth. sed pro *Fas-* *oticus annuus foliis Myriophylli seu Millefolii Aquatici,* *mini* specie haberi non potest; atque ideo à *Mo-* *flore sanguineo.*

P. XI.

H h

SA-

SAMUDRA-STJOGAM.

TABULA LXI.



Convolvulus nascens in arenosis. *Caules* rotundi, villosi, cinereoalbicantes, subvirides, lenes, sub villosa tunica viridifaturi, intus lignosi & medulla instructi. *Folia* in petiolis videntur valde oblongis, rotundis, crassis, interius sulco striatis, villosis, cinereoalbicantibus, subviridibus lenibus, suntque ampla, oblonga, in cuspidem stricta, forma cordis, ad petiolum sinu excisa, crassiuscula, valde mollia, intus glabra, viroris faturi; in adversa parte, densa, cinereoargentea, tomentosa, pannum diceris lanuginosum torculari compressum, tenera, cum lateribus interioribus arcte clausa & unita. *Costæ* in adversa parte eminent, rectam striantes. *Flores* petiolorum vertici plures congregati & fasciati insident, monopetali, campaniformes, stellati, interius fusce rubro purpurei, nitentes, ad oras dilute rubescentes, exterius in collo ut & calyce lanugine albicante, tomentosa vestiti, inferius ad calycem oblongis, cuspidatis, candidis lanuginosis succincti & obtekti foliis. *Stamina* in illis quinque oblonga, candida, *apicibus* grandiusculis, oblongis, candidis, sulcatis dotata. *Stylus* duabus exornatur junctis & granulatis *gemmulis*. *Calyx* arctus est, cujus folia cuspidata & convoluta. *Florum Gemmæ* oblongæ, cuspidatæ. *Fructus* subrotundi sunt, alii duobus, alii tribus extuberantes lateribus, *cuspidem* in vertice gerentes; immaturi *corticem* habent viridifusum, qui incisus copiosum & ardens exsudat lac; maturi aurancei coloris ad flavum vergentis, intus medulla carnosa, dulci, molli, minime lactea instructi. *Semina* in illis tria in distinctis loculis separata, triangulata, viridi flava, carne albicante & dura. Usus non norunt Medici.


TABULA 61.

Convolvulus maximus Malabariensis, folio villosa, floribus purpurascens.

Batta-valli Lat.

သဒ္ဓမ္မာ Mal.

ووعظع واللي Arab



CATTU-VALLI.

TABULA LXII.



Convolvulus arbores scandens. *Caules* rotundi, virides, lignosi, vetustiores cinerei. *Folia* formam lati & obtusi cordis referunt, spissa, viroris in recta parte saturi & nitentis, in adversa viridi diluti & cinerei, *costis* tam media quam lateralibus instructa; illa quæ propius ad caulium confident summitatem, inferioribus sensim minora & contractiora evadunt. Flore & fructu caret. Ex *foliis* balneum præparatur adversus bulimum & malaciam. Ex *radice* cum *Curcuma* & *serolactis* trita linimentum conficitur, artuum dolores mitigans.



Máreta-jnáli Lat.
മറേതകനാളി Mal.

مَرْهَاتُ نَعْلِي Arab.



MARETAINALI.

TABULA LXIII.



Convolvulus arboribus se affigens. *Caules* rotundi, lignosi, geniculati, cinerei, languidi. *Folia* plura congregata in oblongis proveniunt cauliculis, oblongorotunda & angusta, antea cuspidata, valde crassa ac carnosae, plurimis filamentis pertextae, rigidae, durae, in oris rugulis se crispantia, superficie plana & glabra, viridis in recta parte surdi ac fusci, in adversa clari, intus carne viridi aquea & sublaetea. *Costa* in adversa parte alte extuberat, in cuius tractu folia interius sulco sunt striata, saporis amari. *Floribus* destituitur. *Fructus* in geniculis caulium proveniunt oblongo rotundi, nodos referentes lignosos, rugosi, asperi. *Succus* cholerae medetur.

T A B. 62. 63.

Descriptio harum plantarum imperfecta est, ita ut de illis nihil certi possim affirmare.



Vistnú-jlándi Lat.

കിളിത്തറ *mal.*

پیشخو کلا زنجری *Amb.*

കുഴപ്പകൾ *bram.*



VISTNU-CLANDI.

TABULA LXIV.



Uæ hujus plantæ sunt species, *Vistnu-Clandi* & *Sendera-Clandi*. Prior planta humilis est cum cauliculis transversim super terram diffusa. *Radix* tenuis est & recta, in terram se demittens, fibris tenuibus vestita, *cortice* rufo, interius albicante, saporis subdulcis.

Ex illa per plures, valde tenues, rotundi, pilosi, lanuginosi ac virides exeunt cauliculi, cubitum plus minus longi, non in altum sed in latum diffusi. *Folia* valde parva sunt & oblongo rotunda, crassiola, mollia, lenia, in utraque parte lanuginosa, longis ac densis pilis obsita, viroris communis, saporis subdulcis. *Costulæ* in adversa parte nonnihil eminent. *Flores*, quorum petioli tenues lanuginosi, pilosi, virides, longi, qui digitali à floribus intervallo, minutis & cuspidatis sunt vestiti foliolis, supra ex origine foliorum proveniunt, monopetali, stella quinque cuspidem signati, coloris in exteriori superficie inter stellæ cuspides cæruleo diluti, ad umbilicum in stella purpureorubicundi, in umbilico albicantes, exterius in stellæ cuspidibus ex purpureo albicantes. *Stamina* in illis quinque *apicibus* brevibus dotata, cum quibus etiam quatuor vel quinque albicantia erumpunt filamenta. *Calyx* viridis, pilosus, in quinque foliola divisus. *Gemmæ* in vertice pilis albicantibus sunt instructæ. *Flores* ipsi sub vesperam arctissime clauduntur, adeo ut visum pene fugeant; æstivo tempore etiam secunda à meridie hora clausos invenies. *Capsulæ seminales* parvæ & rotundæ, primo virididilutæ, dein flavescentes. *Semina* pro numero angulorum quatuor, tria, vel etiam duo inveniuntur, nullis intersepimentis à se mutuo seclusa, trilaterialia, uno rotundo, duobus planis, depressa, flava vel ruffa, matura rubrofusca. Tota hæc planta vegeti & haud injucundi est odoris

præcipue aquis imposita; tempore pluvioso maximè reperitur, æstivo non nisi in locis umbrosis. Antifebrile est cum *Cumino* decocta; etiam pro extenuatione corporis & morbis chronicis exhibetur. Cum *lacte* assumpta etiam calidas curat febres. *Oleo* incocta & capiti illita capillos promovet.

T A B U L A 64.

Minus genus est *convolvuli*; à me vocatur *Convolvulus Indicus minor*, *Alfine folio*, *flore rubicundo, purpureo*.




Sénoera - Sāndi Lat.

ಎಂಟುಗುಣಿ Mal.

جهاز فضة أكلا رضى Arab.

वेदकाति brm.



SENDERACLANDI.

TABULA LXV.



Ecunda *Clandi* species. *Radix* tenuis, fibrosa, cortice rufo, albicante. *Cauliculi* quinqueangulati, glabri, non pilosi, viridi fuscescentes. *Folia* in utraque parte glabra sunt, oblongoangusta, illis primæ speciei longiora, superiora versus lateribus magis deductis, semilunata, vel etiam duabus semilunulis tricornuis excisa, ad petiolum duobus pedunculis, bicuspidalibus vel tricuspidalibus eminentia. *Flores* odoris expertes, majores sunt illis primæ speciei, monopetali, stellam referentes quinque cuspidalem, alboflavescentes, ad umbilicum purpureorubri. *Stamina* in illis quinque, surrecta, albicantia, apicibus dotata. *Capsulæ* seminales cuspidatæ, foliis *calycis* maxima parte comprehensæ, ex vertice filamentum ejicientes tenue & albicans. *Semina* in illis passim reperiuntur quatuor, trigona, duobus planis, uno rotundo, costula, in medio extuberante, striantur; colorem referunt feminis *Nasturii*. Tempore pluvioso etiam quam maxime invenitur, æstivo non nisi in locis umbrosis. In decocto assumpta antifebrile is. Cum *Zaccharo* ardorem jecoris restringit. In pulverem redacta & cum aqua capiti illita, omnes sedat dolores. Trita & cum *Vaccæ* *urina* epota omnes arthriticos dolores, præcipue in pedibus, mitigat.

TABULA 65.

Convolvulus Indicus minor, folio anguloso, flore ex albo flavescente.

FINIS.

I N D E X.

Prior numerus tabulam, posterior paginam designat.

A.		M.	
	Damboe.	56.	115
	Ambel.	26.	51
	Arega Ambel.		52
B.		Mala Infchi Kua. 14. 29 Malan Kua. 8. 17 Manja Kua. 10. 19 Manjella Kua. 11. 21 Mareta Inali. 63. 129 Mundi Valli. 50. 103 Muien Schena. 19. 37	
	Ballel.	52.	107
	Bel Adamboe.	58.	119
	Belam Canda Schularmani.	37.	73
	Bela Pola.	35.	69
	Belutta Pola Tali.	38.	75
	Bem Tamara.	31.	61
	Ben Tiru Tali.	54.	111
C.		N.	
	Cadenaco, seu, Katu Kapel.	42.	83
	Carim Gola.	44.	91
	Cata Valli vel Kadanaca.	3.	7
	Catulli Pola.	40.	79
	Cattu Valli.	62.	127
	Cit Ambel.	27.	53
	Culi Tamara.	45.	93
			Nir Tjembu. 16. 33
E.		O.	
	Ela Pola.	36.	71
	Elettari.	45.6.	9
I.		Ottel Ambel. 46. 59 Pal Modeca. 49. 101 Panavera Tjeraua. 33. 56 Parua Kelenga. 15. 31 Pongati. 24. 47 Puli Schovadi. 59. 121	
	Inschi vel Inschi Kua.	12.	23
K.		P.	
	Kadanacu vel Catavalla.	3.	7
	Kapa Tsjaka.	1.2.	1
	Karin Pola.	23.	45
	Katou Infchi Kua.	13.	25
	Katsjoula Kelengu.	41.	81
	Kattu Kelengu.	51.	105
	Katu Bala.	43.	85
	Katu Kapel seu Cadenaco.	42.	83
	Katu Schena.	21.	41
	Kodda Pail.	32.	63
	Kua.	7.	13
	Kurka.	25.	49
S.		Samudra Sjogam. 61. 125 Schena. 18. 37 Schovanna Adamboe. 57. 115 Sendera Klandi. 65. 133 Sjovanna Pola Tali. 39. 77	
T.		Tala Neli. 55. 113 Tamara. 30. 59 Tjem Cumulu. 47. 97 Tiru Tali. 53. 109 Tsjana Kua. 8. 15 Tsjeroea Cit Ambel. 29. 57 Tsjuria Cranti. 60. 123	
V.		Va Embu. 48. 99 Vistnu Clandi. 64. 131	
W.		Weli Ila. 22. 43	